

CRE 감염을 예방하려면?

CRE 감염예방을 위해,
올바른 손씻기 등 예방수칙을 준수할 것을 권고합니다.

올바른 손씻기 단계



손씻기가 필요할때는?



환자 및 환자 주변
물건과 접촉 전·후

화장실에 다녀온 후

항생제의 올바른 사용



1. 의사가 처방한 경우에만 사용

2. 복용법과 복용기간 준수

(항생제 복용 임의 중단 자제, 임의 중단할 경우 항생제에 효과가 있는
세균들은 죽고 내성이 있는 일부 세균들만 살아남아 증식 가능)

병문안 문화 준수



1. 의료기관으로 직접 병문안 최소화

(어린이, 노약자 등 병문안 자제 권고)

2. 문자와 영상통화 활용한 병문안 권고

3. 의료기관으로 직접 병문안 시,
의료진이 당부한 주의사항 준수



일반인용

CRE에 대해 알아봅시다



질병관리본부



인천광역시



인천광역시 감염병관리지원단


CRE

카바페넴 내성 장내세균속균종은
무엇인가요?

CRE(Carbapenem - Resistant Enterobacteriaceae)는
특정 항생제의 효과를 볼 수 없는 내성을 가지고 있는 균입니다.

CRE가 속해있는 **장내세균속균종**은 원래 사람의 장에서 정상적
으로 존재하고 있는 균으로 장내가 아닌 방광이나 혈관 내 등 다른
부위로 옮겨갈 시 감염을 일으킵니다.

환자가 항생제를 복용하였을 경우 항생제에 민감한 균들은 죽고,
항생제에 내성을 가지고 있는 일부 균들만 살아남아 CRE와 같은
항생제 내성균이 증식하게 됩니다.



CRE는 어떻게 전파되나요?



CRE 감염위험이 높은 사람은?



- 건강한 사람의 경우 보통 CRE 감염 위험이 낮습니다.
- CRE 감염은 흔히 의료기관에 입원한 면역저하환자, 몸의 일부에 삽입하는 기구를 가지고 있는 환자에게 주로 발생합니다.

CRE에 감염되면 어떤 증상이 나타나나요?



- 건강한 사람의 경우 환자와 접촉하더라도 대부분 증상 없이 균만 가지고 있는 단순 보균 상태로 특별한 치료가 필요하지 않습니다.
- 다만, **감염 고위험군**(면역저하환자, 중환자실 입원환자 등)에서 고열, 오한, 요로감염, 폐렴 등 CRE 감염증상이 나타날 수 있습니다.

* CRE 감염증상 발생 시 의료진의 치료 필수

