

수인성 및 식품매개 감염병 발생 시 소독방법

구토물이나 분변에는 바이러스가 가득하므로,
감염된 사람이 발생한 경우 다음 절차에 따라
소독을 실시합니다.

1. 구토물이나 분변을 처리(소독액 준비)

1



일회용 타월에
제조한 소독액을 적신다

2



소독액을 적신
타월로 구토물을 덮는다

3



적신 타월로 구토물을
감싸서 제거한다

4



제거한 타월을
쓰레기통에 담는다

2. 구토물 등이 있던 곳과 주변을 소독

1



소독액을 적신 타월로
닦은 후, 10분 후
물로도 닦는다

2



사용한 타월과 장갑도
쓰레기통에 담는다

3



쓰레기봉투에
소독액을 뿌린다

4



쓰레기봉투를
밀폐하여 버린다

3. 처리 후에는 흐르는 물에 비누로 30초 이상 올바른 손씻기 실시

1 손바닥

손바닥과
손바닥을
마주대고
문질러 주세요



2 손등

손등과
손바닥을
마주대고
문질러 주세요



3 손가락 사이

손바닥을
마주대고
손가락을 끼고
문질러 주세요



4 두 손 모아

손가락을
마주잡고
문질러 주세요



5 엄지 손가락

엄지손가락을
다른 편 손 바닥으로
돌려주면서
문질러 주세요



6 손톱 밑

손가락을 반대편
손바닥에 놓고
문지르며 손톱 밑을
깨끗하게 하세요



소독액 조제방법



준비물품

가정용 염소계 표백제(염소농도 4%, 예:락스 등), 일회용 고무장갑, 종이타월, 500ml 페트병(잘 씻어 건조한 병), 종이컵(180ml), 마스크 및 앞치마(감염방지용), 쓰레기봉투(버리기 쉽도록 미리 쓰레기통에 씌워놓음)

감염병	염소농도	희석방법
콜레라, 장티푸스, 파라티푸스, 장출혈성대장균 감염증	500ppm(염소 0.05%) * 단 화장실은 20,000ppm(염소2%)	빈생수통 500ml에 소독약 뚜껑 1/5양(0.25mg)의 염소를 붓고, 나머지를 수돗물로 채운다
노로바이러스 감염증	1,000ppm(염소 0.1%)	빈생수통 500ml에 종이컵 1/5양(0.5mg)의 염소를 붓고, 나머지를 수돗물로 채운다
노로바이러스 감염증, 세균성 이질	5,000ppm(염소 0.5%)	빈생수통 500ml에 종이컵 1/3양(2.5mg)의 염소를 붓고, 나머지를 수돗물로 채운다
로타바이러스감염증, A형간염	20,000ppm(염소2%)	빈생수통 500ml에 1/2는 염소액, 1/2는 수돗물로 채운다



1 염소계 표백제를 염소농도에 맞춰 종이컵에 따른다



2 빈 페트병에 붓는다



3 총량이 500ml가 되도록 페트병에 물을 채운다




4 뚜껑을 닫아 잘 흔들어 섞는다

소독 시 주의 사항



장갑, 마스크, 앞치마를 착용 후 소독액 희석 및 소독



소독을 할 때에는 창문을 연 상태 (외부 공기와 접촉 상태)에서 실시하고, 소독 후에도 충분히 환기



소독액은 가연성 물질에 가까이 두지 말고, 희석하여 사용 후에는 소독효과가 떨어지므로 보관하지 말고 버릴것



사용한 걸레를 재사용 시에는 염소계 소독제를 이용하여 소독 후 사용



잠옷, 속옷, 시트, 천 기저귀 등이 오염되었을 경우, 더러워진 곳을 닦아 묶은 소독액에 30분 정도 담근 후 세탁, 젖은 수건을 대고 슌� 다리미로 85도, 1분이상 가열하는 것도 효과