

에이즈 검사는 어디서 받나요?



언제 검사를 받아야 하나요?

검사의 정확성을 위해 감염이 의심되는 일로부터
약 4주 경에 선별검사 받는 것을 권장합니다.




검사는 어떻게 진행되나요?

약 4주 경에 받은 검사 결과가 음성일 경우, 효소면역시험법(EIA)은
최근 노출일로부터 6주 이후, 그 외 검사법은 12주 이후 재검사를 권고합니다.
HIV 감염 진단은 선별검사에서 양성 반응이 나올 경우에 한해
확인검사를 시행합니다.




에이즈, 증상으로는 알 수 없으므로
검사로 감염 여부를 확인하세요.
보건소 익명검사는 무료입니다.



HIV와 에이즈, 바로 알고 검사받자!

불안은 답답
예방은 정답



백 번의 검색보다 한 번의 검사!

검사를 통해 조기에 감염 사실을 확인하면,

- 👉 빠른 치료로 건강한 삶을 살 수 있습니다.
- 👉 타인에게 전파시키는 것을 예방할 수 있습니다.
- 👉 막연한 불안감을 해소할 수 있습니다.


상담은 에이즈 상담센터(1599-8105) 혹은 www.aids114.or.kr에서 받을 수 있습니다.

HIV와 에이즈 바로알기

- 💡 HIV 감염인과 식사를 함께 해도 HIV에 감염되지 않습니다.
- 💡 기침이나 재채기를 통해서도 HIV에 감염되지 않습니다.
- 💡 모기나 벌레 등을 통해서도 HIV에 감염되지 않습니다.
- 💡 HIV 감염인과 손을 잡거나 함께 운동을 해도 HIV에 감염되지 않습니다.
- 💡 HIV 감염인과 목욕탕, 화장실 및 변기를 함께 사용해도 HIV에 감염되지 않습니다.

콘돔 사용은 효과적인 에이즈 예방법입니다.

콘돔은 손쉽게 이용할 수 있는 효과적인 에이즈 예방법입니다.
성관계를 하는 동안 콘돔을 올바르게 계속적으로 사용해 왔다면,
에이즈에 감염될 위험성은 거의 없습니다.



에이즈 감염경로



감염인과의
안전하지 않은 성관계



감염인이 사용한
주사기 공동사용



감염된
혈액 수혈



감염된 여성의 임신,
출산, 모유 수유

★ 우리나라의 경우, 99% 이상이 성관계로 감염됨 ★

올바른 콘돔 사용법



STEP 1

콘돔을 포장에서 꺼내 끝에 있는
볼록한 곳을 잡고 비튼다.



STEP 2

콘돔을 발기된 음경에 씌운다



STEP 3

사정 후 음경이 위축되기 전에
콘돔 끝 부분을 잡고 빼낸다.



STEP 4

사용 한 콘돔은 묶어서
휴지에 싸서 버린다.

★ 유통기한 확인

★ 윤활제는 반드시 수용성 사용

★ 재사용 금지