


ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



- 01 국내 코로나19 현황
- 02 인천광역시 코로나19 현황
- 03 국외 코로나19 현황
- 04 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 05 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황(수족구병)
- 06 국내외 감염병 뉴스
- 07 [주간 감염병 Special] 원숭이두창(Monkeypox)
- 08 [홍보자료] 투표관련 외출 시 준수사항



01

국내 코로나19 현황


출처: 질병관리청 홈페이지

국내 발생 현황

2022.5.22. 0시 기준 (단위: 명)

구분	5월 15일	5월 16일	5월 17일	5월 18일	5월 19일	5월 20일	5월 21일
사망	48	35	27	31	40	43	26
재원 위중증	338	345	333	313	274	251	235
신규 입원	273	157	264	240	215	229	275


국내 일별 확진자 발생 현황



전국 시도별 발생 현황

출처: 질병관리청 홈페이지


발생률 (명/인구 10만 명당)



2022.5.22. 0시 기준 (단위: 명, %)

지역	확진자 누계	전국 비율	누적 사망자수
합계	17,957,697	100.0%	23,965
서울	3,593,076	20.0%	4,797
부산	1,085,525	6.0%	2,123
대구	748,356	4.2%	1,310
인천	1,066,303	5.9%	1,385
광주	527,180	2.9%	552
대전	505,084	2.8%	682
울산	373,371	2.1%	336
세종	136,990	0.8%	35
경기	4,891,462	27.2%	6,184
강원	508,278	2.8%	834
충북	548,255	3.1%	714
충남	706,421	3.9%	948
전북	592,138	3.3%	864
전남	588,463	3.3%	449
경북	764,395	4.3%	1,343
경남	1,078,942	6.0%	1,218
제주	232,333	1.3%	175
검역	11,125	0.1%	16

일일 신규 확진자 발생 추이




주간 발생 현황


2022.5.22. 0시 기준 (단위: 명)

구분	사망	재원 위중증	신규 입원	확진
최근 7일간 일평균 (5.15.~5.21.)	2.4	26.0	6.9	1,153.3
(누적)사망 1,385명		(누적)확진 1,066,303명		


▶ 사망




▶ 재원 위중증



▶ 신규 입원



▶ 확진



주간 위험도 평가 지표


최근 1달간 1주 간격 위험도 평가 지표

- 최근 1주간(5.15.~5.21.) 일평균 확진자 수는 1,153.3명으로 직전 1주(1,631.4명)보다 478.1명(29.3%) 감소하였음
 - 해외유입 일평균 확진자 수는 7.7명으로 직전 1주(5.3명)보다 2.4명(45.9%) 증가
 - 60세 이상 일평균 확진자 수는 203.6명으로 전체 확진자 중 비중은 17.7%임
 - 18세 이하 일평균 확진자 수는 222.7명으로 전체 확진자 중 비중은 19.3%임

구분		18주 (4.24.~4.30.)	19주 (5.1.~5.7.)	20주 (5.8.~5.14.)	21주 (5.15.~5.21.)
주간 일평균 확진자 수(명)	국내발생	2,618.7	1,790.0	1,626.1	1,145.6
	해외유입	6.7	9.0	5.3	7.7
	전체	2,625.4	1,799.0	1,631.4	1,153.3
주간 60세 이상 확진자 수(명)		3,917	2,519	2,125	1,425
60세 이상 확진자 비율(%)		21.3	20.0	18.6	17.7
주간 18세 이하 확진자 수(명)		3,596	2,395	2,314	1,559
18세 이하 확진자 비율(%)		19.6	19.0	20.3	19.3
실시간 감염재생산수(Rt)		0.70	0.78	0.85	0.82
코로나19 예방접종률(%)		1차 2차 3차 4차	1차 2차 3차 4차	1차 2차 3차 4차	1차 2차 3차 4차
		87.6 86.7 64.3 3.5	87.6 86.7 64.3 4.9	87.6 86.7 64.4 6.0	87.6 86.7 64.5 6.7
		'22.5.1. 0시 기준	'22.5.8. 0시 기준	'22.5.15. 0시 기준	'22.5.22. 0시 기준

실시간 감염재생산수(Rt)

- 2020.1.20.~2022.5.21. 인천광역시 일별 확진자(확진일) 자료를 이용해서 추정한 값임



- 1) 실시간 감염재생산수(Time-varying reproductive number, Rt): 특정 시점 t에서 인구집단의 평균 감염력
- R < 1: 감염병의 유행이 일어나지 않고 사라짐,
R = 1: 지역사회에 일정 수의 감염자가 유지됨,
R > 1: 감염병의 유행이 일어남
- 2) Cori 방법 이용, 각 점은 1일을 의미함

병상 현황

2022.5.21. 18시 기준(단위: 병상, %)

구분	확보병상	사용병상		가용병상	
감염병전담	493	39	7.9	454	92.1
중증환자전담	375	33	8.8	342	91.2
준중증환자전담	579	68	11.7	511	88.3
생활치료센터	170	17	10.0	153	90.0

03

국외
코로나19 현황


출처: <https://ourworldindata.org/covid-cases>

국외 주간 발생 현황

- ✓ 전 세계 주간 확진자 발생 규모
- 누적 총 525,271,853명, 사망 6,276,601명 발생
 - 지난 1주간(5.15.~5.21.) 일평균 신규 확진자 549,669명, 사망 1,612명 발생

📍 주간 일평균 신규 확진자 발생 규모

2022.5.22. 0시 기준 (단위: 명/인구 100만 명당)



주요 10개국 발생 현황

2022.5.22. 0시 기준 (단위: 명, %)

지역	누적 확진자	최근 7일 평균 신규 확진자	누적 사망자수	치명률
미국	83,263,020	115,527	1,002,146	1.20%
대만	1,240,897	77,296	1,343	0.11%
스페인	12,234,806	53,842	105,952	0.87%
호주	6,948,967	51,272	8,097	0.12%
일본	8,583,048	35,456	30,287	0.35%
프랑스	29,426,295	30,172	147,851	0.50%
이탈리아	17,229,263	28,445	165,918	0.96%
대한민국	17,957,697	25,091	23,965	0.13%
태국	4,411,494	7,530	29,746	0.67%
중국	1,181,726	5,404	5,222	0.44%

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국				
		2022				동기간대비 (1-21주)				동기간대비 (1-21주)				
		21주	20주	19주	18주	2022	2021	증감	5년 평균	2022	2021	증감	5년 평균	
1급	보툴리눔독소증									5		▲ 5	1	
	중동호흡기증후군(MERS)													
	동물인플루엔자 인체감염증													
2급	수두	21	26	11	20	335	445	▼ 110	973	6,236	8,119	▼ 1,883	20,190	
	홍역												35	
	콜레라													
	장티푸스						1	▼ 1		19	33	▼ 14	53	
	파라티푸스					2		▲ 2	1	11	6	▲ 5	14	
	세균성이질									8	4	▲ 4	32	
	장출혈성대장균감염증									31	21	▲ 10	24	
	A형간염		4	2	5	67	190	▼ 123	170	989	2,461	▼ 1,472	2,366	
	백일해				1	2		▲ 2	9	13	7	▲ 6	104	
	유행성이하선염	5	9	9	6	131	164	▼ 33	247	2,569	3,379	▼ 810	4,853	
	풍진												1	
	수막구균 감염증												4	
	b형헤모필루스인플루엔자										1	▼ 1	1	
	페렴구균 감염증					17	5	▲ 12	15	151	104	▲ 47	215	
	한센병										3	▼ 3	2	
	성홍열					6	13	▼ 7	141	179	310	▼ 131	2,897	
	VRSA 감염증									1	1	-	0	
	CRE 감염증	24	49	57	58	836	580	▲ 256	545	9,729	7,826	▲ 1,903	6,618	
	E형간염	1		2		6	3	▲ 3	5	206	156	▲ 50	181	
	3급	파상풍									5	8	▼ 3	9
		B형간염			1	1	9	11	▼ 2	9	164	178	▼ 14	154
일본뇌염														
C형간염		9	14	14	13	259	314	▼ 55	323	3,325	4,428	▼ 1,103	4,206	
말라리아		1	2	1		6	12	▼ 6	8	23	58	▼ 35	52	
레지오넬라증						5	6	▼ 1	8	101	134	▼ 33	127	
비브리오패혈증										2	1	▲ 1	1	
발진열		1	2		1	8	1	▲ 7	2	14	2	▲ 12	4	
쯔쯔가무시증		1				3	6	▼ 3	5	320	298	▲ 22	350	
렙토스피라증						1	1	-	0	0	29	23	▲ 6	20
브루셀라증										4		▲ 4	2	
신증후군출혈열							1	▼ 1		47	90	▼ 43	71	
CJD/vCJD							1	▼ 1		5	30	▼ 25	20	
뎅기열										2		▲ 2	28	
큐열				1		1		▲ 1	1	22	15	▲ 7	38	
라임병										2	6	▼ 4	6	
유비저											2	▼ 2	1	
치쿤구니야열										2		▲ 2	2	
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)										13	13	-	0	14
지카바이러스 감염증														0

- 21주차(2022.5.15.~2022.5.21.) 전수감시 신고 현황은 2022.5.26.(목) 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2021-2022년 자료는 변동가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2018-2022)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가감염병감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년간(2018-2022) 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 야토병, 신종감염병증후군, 중증급성호흡기증후군, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외함

수족구병 표본감시 현황

주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황


- (전국) 20주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 0.7명으로 전주(0.4명) 대비 증가
- (인천) 20주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 2.6명으로 전주(0.0명) 대비 증가

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명


구분		2022년							
		13주	14주	15주	16주	17주	18주	19주	20주
전국	전체	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.7
	0-6세	0.3	0.4	0.1	0.4	0.3	0.2	0.5	0.9
	7-18세	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.3	0.0	0.1
인천	전체	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
	0-6세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
	7-18세	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1) 수족구병 의사환자 분율(천분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000


2018-2022년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




2018-2022년 주별 수족구병 의사환자 분율(인천)



2022년 20주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



2022년 20주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(인천)



- 20주차(2022.5.8.~2022.5.14.) 인플루엔자 표본감시 현황은 2022.5.23.(월) 질병관리청 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2022년도 20주차 감염병 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
 - * 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람
- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 95개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)
 - * 인천광역시 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원): 6개

인천 감염병 뉴스

- [인천시, 내달 1일부터 임시 선별검사소 운영 중단 <2022.5.25. 연합뉴스>](#)

인천시가 현재 운영 중인 코로나19 임시선별검사소 운영을 다음 달 1일 모두 중단한다고 25일 밝혔다. 인천시는 2020년 12월 임시 선별검사소 운영을 시작했으며 최대 17곳까지 늘려 365일 연중 운영하다가 현재는 주안역·인천시청 광장 등 6곳에서 운영하고 있다. 그러나 최근 하루 검사자가 300명선에 그치며 임시선별진료소 운영을 중단하기로 하였고, 각 군·구 보건소 선별진료소 11곳은 현재와 마찬가지로 PCR 검사 서비스를 계속 제공할 방침이다.

국내 감염병 뉴스

- [수도·홍역·급성간염..되찾은 일상 뒤따른 '불청객' <2022.5.20. 머니투데이>](#)

세계보건기구(WHO)와 유니세프에 따르면 올해 1~2월 세계 홍역 환자 발생 건수가 1만 738건으로 지난해 같은 시기보다 79.3% 급증했다. 코로나19 유행 완화로 전 세계적 일상회복이 시작되자 홍역, 독감 등 호흡기 감염병도 지난 해 보다 늘어나고 있다는 것이 WHO와 유니세프의 분석이다. 질병관리청에 따르면 일단 국내에서는 2020년 3월 이후 홍역 감염은 없다. 다른 감염병도 코로나19 유행 이후 크게 줄었는데, 급성 A형 간염과 백일해도 2019~2020년 사이 절반 이상 줄었고, 지난 해에는 더 감소했다. 이러한 현상은 '코로나19의 역설'이 배경이다. 코로나19 유행 이후 마스크 착용, 손씻기, 거리두기 등 개인 방역이 충실히 지켜지면서 코로나19 외의 다른 감염병의 확산까지 막는 효과가 나타난 것이다. 그러나 최근 마스크착용 의무 해제, 전면 등교 시작 등 거리두기가 해제되며 코로나19는 물론 다른 감염병이 확산할 가능성이 더욱 높아질 수 있다는 것이 의료계의 분석이다.

- [오미크론 하위변이 BA.2.12.1 추가 13건 확인...BA.5 국내감염도 3건 <2022.5.24. 경향신문>](#)

코로나19 오미크론 하위변이 감염사례가 늘고있다. 24일 방대본에 따르면 지난 21일 기준 국내 오미크론 하위변이인 BA.2.12.1 감염 건수가 추가로 13건 확인돼 총 36건으로 늘었다. 이 변이는 스텔스 오미크론이라 불리는 BA.2보다 전파력이 20%이상 강하며 미국에서 유행규모를 키우고 있는 변이이다. 또한 BA.4는 1건, BA.5는 4건이 추가로 검출됐다. 이러한 변이종들은 모두 전파력이 높아도 중증도에 영향을 미친다는 증거는 확인되지 않고 있으며, 아직 국내 지역사회 전파가 활발히 이루어진다는 특이 동향은 발견되지 않았다.

- [중대본 "확진자 투표 시행착오 재발 않도록...하라인 가동"\(종합\) <2022.5.25. 연합뉴스>](#)

중대본이 6.1 지방선거 투표 기간에 '하라인'을 개설해 지난 3월 대통령선거에서 겪은 확진자 투표 시행착오가 재발하지 않도록 준비하겠다고 밝혔다. 보건복지부, 행정안전부, 질병관리청이 신속히 협의할 수 있는 중앙부처 하라인을 오는 27일부터 다음달 1일까지 운영하기로 했다. 지난 대선에서 확진자와 비확진자 투표시간이 혼재돼 선거 관리에 문제가 있었던 시행착오들을 바로잡기 위함이다. 또한 질병관리청은 확진자 외출 방역수칙 가이드라인을 논의하고 있고, 행안부에서는 개표소나 투표소 준비 상황 점검, 시간 분리 대처, 혼선 발생 시 대처 등을 논의하고 있다고 밝혔다.

- [오늘부터 입국시 신속항원검사도 인정...방역절차 간소화 <2022.5.23. NEWSIS>](#)

정부가 23일부터 해외 입국자가 입국 전에 받아야 하는 코로나19 검사로 PCR검사 뿐 아니라 전문가용 신속항원검사(RAT)도 인정한다고 밝혔다. 해외 입국자는 국내로 들어오기 전 48시간 이내에 시행한 PCR 음성 확인서나, 24시간 이내에 시행한 RAT 음성 확인서를 제출하면 된다. 이는 국내에서RAT를 표준 확진 방법으로 인정하고 있으며, 해외에서도 PCR검사를 RAT로 대체하고 있는 추세를 반영한 조치이다. 그러나 일본과 인도네시아 등 RAT를 확진 체계를 인정하지 않는 국가를 방문한 경우에는 기존처럼 PCR검사 결과를 제출해야 한다. 또한 입국 1일차 PCR검사는 3일 이내로 기간이 늘어나며, 18세 미만의 입국시 격리의무에 대해서도 2차 접종 후 14일이 경과하면 격리가 면제된다.

국외 감염병 뉴스

- [WHO "원숭이두창 확산 억제 가능"...유럽질병통제센터 "폭넓은 확산 가능성 낮아"<2022.5.24. 경향신문>](#)

세계보건기구(WHO)는 최근 유럽 등에서 확산되고 있는 원숭이두창에 대해 전파 확산을 억제할 수 있다는 입장을 밝혔다. WHO는 원숭이두창은 밀접 신체 접촉을 통해 전파가 되기 때문에 코로나19처럼 쉽게 전파되지 않고, 증상도 그렇게 심하지 않을 뿐 아니라 조기 인지 및 격리 등 공중 보건 수단을 쓸 수 있는 상황이라고 설명했다. 또한 유럽질병예방통제센터(ECDC)도 일반 대중 사이에 폭넓게 확산할 위험은 매우 낮다는 입장을 밝혔다. 다만 밀접접촉, 예컨대 다수의 성적 파트너가 있는 사람들 사이의 성행위를 통한 바이러스 추가 확산 가능성은 높을 것이라고 덧붙였다.

- 1) European Centre for Disease Prevention and Control, Epidemiological update: Monkeypox outbreak(20 May 2022).
- 2) World Health Organization. Disease Outbreak News: Multi-country monkeypox outbreak in non-endemic countries(21 May 2022).
- 3) 질병관리청. 원숭이두창 진단체계 구축 (보도자료). 2022.5.22.
- 4) Hamins-Puertolas, Marco and Charnipon, Marie and Majumder, Maimuna, An Early Transmissibility Estimate for the 2022 Monkeypox Outbreak (23 May 2022). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=>
- 5) 질병관리청. 원숭이두창 국내 유입방지를 위한 감시 대응 강화(보도참고자료). 2022.5.24.
- 6) '최장 21일' 잠복기 긴 원숭이두창... "두 가지로 예방 가능", 머니투데이, 2022.5.24. <https://n.news.naver.com/article/008/0004749770>


Epidemiological update: 원숭이두창(Monkeypox)

✓ 원숭이두창이란?¹⁻³⁾

- Monkeypox 바이러스 감염에 의한 인수공통감염병으로 사람 두창과 유사하나 중증도는 낮다.
- (전파경로) 감염 환자의 상처, 체액, 호흡기 비말 또는 바이러스로 오염된 물질(침구 등)과 긴밀한 접촉했을 경우 감염이 된다.
- (증상) 잠복기는 보통 6~13일 정도이며, 발열(>38.5℃), 두통, 근육통, 요통, 림프절 비대, 오한, 허약감 등의 증상을 시작으로 1~3일 후에 얼굴을 중심으로 피부 발진이 번져 나간다. 이러한 증상은 약 2~4주간 지속된다.
- (전파력⁴⁾) 가장 최근 발표된 기초감염재생산수(Basic reproduction number, R_0) 분석 결과에서 원숭이두창의 R_0 는 1.15~1.26로, 코로나19나 SARS 보다 낮은 것으로 보고되었다.
- (치명률) 약 3~6% 정도이며, 주로 어린이나 젊은 성인에서 사망사례가 보고되었다.
- (백신) 두창 백신으로 80~85% 정도 예방이 가능하며, 2019년에 원숭이두창에 대한 백신(MVA-BN)이 승인된 바 있지만 아직 보편화되지는 않았다.
- (변이 발생 가능성) 원숭이두창 바이러스는 Poxviridae 계통의 Orthopoxvirus 속에 속하는 이중 가닥 DNA를 가진 외피 보유 바이러스로, 복제 과정에서 안정적으로 복제가 일어나 변이가 일어날 가능성이 낮다고 보고 있다.

✓ 현재 세계 발생상황

- 2022년 4월 말부터 현재까지(2022.4.29.~5.24.) 유럽 및 북미, 오세아니아 지역 등 총 18개국에서 확진 171명, 의심 86명이 지속적으로 보고되고 있다⁵⁾.
- 현재까지 알려진 바에 의하면, 아프리카 여행력이 없는 20~40대 젊은 남성(성소수자)에서 주로 발생했다는 것이 특징적이며, 대부분의 환자가 성병 클리닉에서 확인되었다. 성 접촉을 통한 감염 가능성 여부는 불분명하며, 이에 대한 추가 연구가 필요하다.
- 사망 사례는 아직 보고되지 않았다.

● 세계 원숭이두창 발생 분포 (2022.5.13.-21, WHO 보고 기준)⁶⁾

1) 질병관리청. 원숭이두창 국내
유입방지를 위한 감시 대응
강화(보도참고자료). 2022.5.24.

Epidemiological update: 원숭이두창(Monkeypox)

✓ 국내 대응 상황¹⁾

- 현재 우리나라에서 발생은 보고되지 않았으며, 국내 유입 방지를 위해 원숭이두창 발생 국가*에서 들어오는 모든 입국자 감시·대응을 강화하고 있다.
 - ※ 입국자 발열체크 및 건강상태질문서 작성, 귀국 후 3주 이내 의심증상**이 있을 경우 즉시 질병관리청 콜센터(1339) 연락 당부
 - * 서아프리카, 중앙아프리카, 영국, 포르투갈 스페인, 스웨덴, 미국, 캐나다, 이탈리아, 벨기에, 독일, 네덜란드, 이스라엘, 스위스, 호주, 덴마크, 오스트리아
 - ** 38도 이상 발열, 오한, 두통, 림프절부종, 얼굴에서 손·발로 퍼지는 발진
- 질병관리청은 그간 미래감염병에 대한 진단체계 구축을 지속적으로 추진하여 왔으며, '원숭이두창 진단검사법 및 시약' 개발과 평가까지 완료하였다.
- 상황변화에 따라 관리대상 해외감염병 지정 등도 검토하고 있다.

✓ 원숭이두창 예방 및 행동수칙

- 일반적인 감염병 예방수칙 준수
 - 마스크 착용 및 개인적인 위생수칙(손씻기 등) 준수
 - 오염된 손으로 눈, 코, 입 등 점막 부위 접촉 삼가
 - 보건인력 환자 관리 시 상황(치료, 간호, 이송 등)에 적절한 개인보호구 착용 및 관리조치 수행
- 원숭이두창 발생지역 방문 시 주의사항
 - 방문 전, 원숭이두창 풍토병 지역 및 발생지역 확인
 - 아프리카 등 발생지역에서 설치류(다람쥐 등), 영장류 등의 동물사체 접촉금지 및 섭취 금지
 - 원숭이두창 (의심)환자와 접촉 금지
 - ✓ 원숭이두창 의심 증상을 가진 사람과 접촉금지
 - ✓ 원숭이두창 의심 증상을 가진 사람의 물건 등과 접촉 금지
 - ✓ 원숭이두창 발생지역 야생동물 접촉금지

투표관련 외출 시 준수사항

대국민



외출 전

- ☑ 외출 전 **보건용 마스크**(KF80 또는 동급 이상)를 착용하고 **여분의 마스크**(KF80 또는 동급 이상)를 소지 후 외출



이 동

- ☑ 도보 또는 대중교통 이용 시, **마스크**(KF80 또는 동급 이상)를 상시 착용하고 타인과 거리를 유지하며, **이동 시 불필요한 대화 자제**



투 표

- ☑ 일반인 투표일 : **사전투표**(5.27.~5.28.), **선거일투표**(6.1.)
- ☑ 투표 전 발열 및 호흡기 증상이 있을 경우 투표사무원 등에게 증상이 있음을 밝히고 투표사무원 등의 안내에 따라 투표
- ☑ 투표소 내에서는 본인 확인을 위한 절차 외에는 **마스크**(KF80 또는 동급 이상)를 상시 착용하고 불필요한 대화 및 접촉을 자제
- ☑ 투표소 내외에서는 투표소에 표시된 거리두기 간격에 따라 대기 시 일정 거리 유지
- ☑ 투표 후 가급적 사람이 많은 장소에 방문 또는 사적 모임을 자제하고 귀가



귀가 후

- ☑ 물과 비누 또는 손세정제, 손소독제를 이용하여 **손위생 실시**

