

Инструкция по применению "Лагеврио"

Наименование продукта	Капсула "Лагеврио"
Состав / Содержание	(Активное вещество) Молнупиравир 200 мг (в 1 капсуле)
Описание	Оранжевая капсула
Способ применения / Дозировка	• Принимать по 4 капсулы за раз, 2 раза в день, всего 10 доз в течение 5 дней. • Начните прием препарата после подтверждения COVID-19 и в течение 5 дней со дня появления симптомов. • В случае госпитализации в период приема, решение о продолжении приема будет определяться медицинским персоналом.
Эффективность / Действие	Лечение пациентов с подтвержденным COVID-19, у которых заболевание протекает в лёгкой и средней степени, но высок риск развития до тяжелой формы Но назначается только пациентам, которые не могут принимать другие лекарственные средства от COVID-19, или тем, кому другие лекарственные средства от COVID-19 не подходят клинически.
Условия хранения	Хранить при комнатной температуре 15°C~30°C

♣ Как принимать капсулы "Лагеврио"?

Принимать 4 капсулы за 1 прием, В течение 5 дней, 2 раза в день -> Принимать в общей сложности 10 доз



- Можно принимать независимо от приема пищи. Важно завершить лечение в общей сложности 10 дозами в течение 5 дней без перерыва.
- Следует глотать целиком. Капсулу нельзя открывать, дробить или разжевывать.
- Необходимо принимать препарат каждые 12 часов, поэтому при первом приеме первой дозы выберите время, удобное для вас согласно вашему образу жизни. Например) 09:00/21:00

♣ Что делать, если в забыли о приёме препарата?

① Если с момента, когда вы забыли принять препарат, прошло не более 10 часов	② Если с момента, когда вы забыли принять препарат, прошло более 10 часов
- Примите сразу же, как вспомните, а следующую дозу - в первоначально запланированное время. - После этого следуйте первоначальнозапланированному графику приема.	- Пропустите прием, о котором забыли, и примите обычную дозу в следующее запланированное время. - Затем следуйте первоначально запланированному графику приема.
(Не принимайте двойную дозу за один прием.)	

♣ Каковы меры предосторожности, которые следует соблюдать при приеме "Лагеврио"?

1. В течение приема этого препарата наблюдались случаи возникновения гиперчувствительности, включая анафилактическую реакцию. Если после приема этого препарата появляются признаки и симптомы гиперчувствительности (крапивница, сыпь, одышка и т. д.) или анафилаксии, немедленно прекратите прием этого препарата, сообщите в свое медицинское учреждение и начните надлежащее лечение.
2. Этот препарат **нельзя применять беременным** женщинам. Женщины детородного возраста должны принимать этот препарат **после подтверждения того, что они не беременны**. Если вы приняли препарат, **не зная о беременности, немедленно прекратите прием и проконсультируйтесь с врачом**. Вы также можете связаться с "MSD Korea Ltd." (02-331-2000) для получения справочной информации или консультации.
3. В период приема этого препарата **женщинам, планирующим забеременеть, следует использовать эффективные методы контрацепции** во время и **в течение 4 дней после приема последней дозы**, а мужчинам, у которых есть партнер (супруга) детородного возраста, - **до 3 месяцев**. Кроме того, **если вы кормите грудью, Вам следует прекратить грудное вскармливание** в течение приема препарата **и на срок до 4 дней после приема последней дозы этого препарата**.
4. Выдавать другим лицам лекарственное средство без назначения врача очень опасно и может повлечь за собой наказание согласно соответствующим законам. По правилам, если прием лекарственного средства прекращается из-за таких симптомов, как побочные реакции после приема, оставшиеся таблетки следует вернуть для их утилизации.

♣ **Каковы возможные побочные действия?**

		
Диарея	Тошнота	Головокружение

*Помимо этих симптомов могут проявиться и другие побочные действия. При возникновении побочных действий после приема этого лекарственного средства сначала обратитесь к фармацевту или в ваше медицинское учреждение для получения консультации. Также, пожалуйста, сообщите в Корейский институт по

вопросам безопасности лекарственных средств и управления рисками (1644-6223) по поводу возникших побочных действий.

- Если у вас возникли дополнительные вопросы, посетите сайт Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (www.kdac.or.kr) или обратитесь в местный медицинский центр.

