

Arahan Pemberian "Lagevrio"

Nama Produk	Kapsul Lagevrio
Bahan/ Kandungan	(Bahan Aktif) Molnupiravir 200mg (setiap kapsul)
Penerangan	Kapsul oren
Penggunaan/D os	- Ambil 4 biji kapsul, 2 dos setiap hari yang berjumlah 10 dos selama 5 hari. - Mulakan rawatan dalam tempoh 5 hari bermula hari anda mengalami gejala setelah disahkan dijangkiti COVID-19. - Jika anda dimasukkan ke hospital semasa rawatan, penerusan pemberian ubat ini akan ditentukan oleh ahli perubatan.
Kesan/ Manfaat	Rawatan untuk individu yang disahkan dijangkiti COVID-19 dengan gejala ringan dan sederhana yang mempunyai risiko tinggi untuk mengalami gejala teruk. Walau bagaimanapun, ia hanya boleh digunakan untuk pesakit yang tidak boleh menggunakan rawatan COVID-19 atau golongan yang tidak sesuai menerima rawatan lain untuk COVID-19 secara klinikal.
Penyimpanan	Simpan pada suhu bilik (15°C-30°C)

♣ Cara pengambilan Lagevrio?

Ambil 4 biji kapsul sekaligus. 2 dos setiap hari selama 5 hari -> Sejumlah 10 dos



- Anda boleh mengambilnya dengan atau tanpa makan. Pastikan anda **lengkapkan rawatan** dengan 10 dos sepenuhnya selama 5 hari **secara berterusan.**
- Jangan kunyah atau potong kapsul.** Sila telan seluruh biji tablet.
- Anda perlu mengambilnya pada jarak setiap 12 jam. Pastikan Anda tetapkan masa pengambilan dos pertama pada waktu yang sesuai dengan gaya hidup anda. Cth) 9:00 pagi/9:00 malam

♣ Apa yang harus saya lakukan jika terlupa makan ubat pada masanya?

① Jika Anda terlupa mengambil satu dos dalam masa kurang daripada 10 jam:	② Jika lebih daripada 10 jam telah berlalu sejak waktu yang anda jadualkan untuk makan ubat:
- Ambil dengan segera apabila anda mengenalinya dan ambil dos seterusnya pada masa asal yang anda tetapkan. - Ikut waktu makan ubat asal selepas itu.	- Jangan makan ubat semasa anda sedar bahawa anda terlupa. Sebaliknya, makan dos seterusnya pada waktu yang telah anda jadualkan. - Ikut waktu makan ubat asal selepas itu.
(Jangan ambil dos berganda sekaligus.)	

♣ Apakah langkah berjaga-jaga jika mengambil Lagevrio?

1. Tindak balas hipersensitif, termasuk anafilaksis, telah dilaporkan terjadi pada individu yang diberikan ubat ini. Jika anda mengalami tanda-tanda dan gejala tindak balas hipersensitif (cth. palpitasi, ruam, kesukaran bernafas) atau anafilaksis selepas mengambil ubat ini, segera hentikan pengambilan ubat ini dan maklumkan kepada institusi perubatan yang ditetapkan untuk memulakan rawatan ubat yang sesuai.
2. Ubat ini **tidak boleh diberikan kepada wanita hamil**, dan wanita yang berpotensi hamil hanya boleh mengambil ubat ini setelah **mengesahkan mereka tidak hamil**. Jika anda mengambil ubat ini **tanpa mengetahui bahawa anda hamil, berhenti mengambil ubat dengan serta-merta dan dapatkan nasihat ahli perubatan**. Anda juga boleh hubungi atau dapatkan nasihat daripada MSD Korea(02-331-2000).
3. **Wanita yang merancang untuk hamil** semasa mengambil ubat ini harus menggunakan kontraseptif yang berkesan **semasa dan sehingga empat hari selepas dos terakhir**, dan **golongan lelaki** dengan pasangan yang berumur boleh hamil harus menggunakan **pencegahan kehamilan yang berkesan sehingga tempoh tiga bulan**. Seterusnya, **ibu yang menyusukan anak** harus **menghentikan penyusuan badan** semasa rawatan dan **sehingga 4 hari selepas dos terakhir** ubat ini.

4. Mengambil ubat yang dipreskripsikan oleh doktor kepada orang lain tanpa kebenaran doktor adalah sangat berbahaya. Tindakan sedemikian boleh dihukum menurut undang-undang berkaitan. Secara asasnya, jika pemberian ubat dihentikan kerana gejala seperti tindak balas luar biasa setelah mengambil ubat, baki kapsul perlu dipulangkan dan dibuang.

♣ **Apakah kesan sampingan yang mungkin berlaku?**

		
Cirit-birit	Loya	Pening

* Di samping gejala di atas, terdapat kesan sampingan yang lain. Jika anda mengalami sebarang kesan sampingan setelah mengambil ubat ini, hubungi ahli farmasi atau institusi perubatan anda untuk khidmat nasihat. Anda juga boleh melaporkan kesan sampingan kepada

Institut Keselamatan dan Pengurusan Risiko Ubat Korea (KIDS) menerusi talian penting (1644-6223).

- Untuk maklumat lanjut, layari laman web rasmi Agensi Kawalan dan Pencegahan Penyakit Korea (www.kdac.or.kr) atau pusat kesihatan tempatan.

