

‘Лагеврио’ эмийн заавар

Бүтээгдэхүүн нэр	Лагеврио капсул
Найрлага /Орц	(Идэвхтэй найрлага) молнупиравир 200мг (1 капсул тутамд)
Тодорхойл олт	Улбар шар өнгийн капсул
Хэрэглээ/Тун	1 өдөрт 2 удаа, 1 удаад 4 капсулыг 5 хоногийн турш нийт 10 удаа ууна. - Ковид-19-ийн шинжилгээ эерэг гарч, шинж тэмдэг илэрснээс хойш 5 хоногийн дотор эмчилгээг эхлүүлнэ. - Хэрэв та эм ууж байхдаа эмнэлэгт хэвтсэн бол эмийг Үргэлжлүүлэн хэрэглэх эсэх нь эмнэлгийн ажилтнуудаас хамаарна.
Үр нөлөө/Үр дүн	ПГУ-ын шинжилгээ Ковид-19-ээр халдварласан, хүнд хэлбэрт шилжих магадлалтай, одоогоор хөнгөн болон дунд зэргийн шинж тэмдэгтэй насанд хүрсэн болон өсвөр насны (12-оос дээш насны, 40 кг ба түүнээс дээш жинтэй) өвчтөнд хэрэглэх эмчилгээ Зөвхөн Ковид-19 эм хэрэглэх боломжгүй эсвэл бусад коронагийн эм эмнэлзүйн хувьд тохиромжгүй байгаа өвчтөнүүдэд л хэрэглэж болно.
Хадгалах заавар	15°C~30°C тасалгааны температурт хадгална

♣ Лагевриог яаж хэрэглэх вэ?

4 капсулыг нэг дор ууна, 1 өдөрт 2 удаа, 5 хоногийн турш ->Нийт 10 удаа уух



- Хоолноос хамаарахгүй ууж болох ба 5 хоногийн турш нийт 10 удаа ууж, **эмчилгээгээ таслахгүй дуусгах** нь чухал.
- Эмийг бүхлээр нь залгих ёстой бөгөөд **капсулыг нээх, бутлахыг хориглоно.**
- Та 12 цаг тутамд уух ёстой тул анхныхаа уултыг амьдралын хэв маягт тааруулан марталгүй уух боломжтой цагт тохируулаарай. жишээ нь) өглөөний 9, /21.00

♣ Хэрэв та эм уухаа мартсан бол яах вэ?

① Хэрэв та 10 цагийн дотор эм уухаа мартсан бол	② Хэрэв та эм уухаа мартсанаас хойш 10 цагаас илүү хугацаа өнгөрсөн бол
- Санасан даруйдаа ууж, дараагийн тунг анх төлөвлөсөн цагтаа уугаарай. - Үүний дараа уухаар товолсон цагаа баримтлах	- Уугаагүй тунг алгасаад дараагийн хуваарьт цагтаа уух тунгаа ууна - Үүний дараа уухаар товолсон цагаа баримтлах
(Нэг удаа давхар тун ууж болохгүй.)	

♣ Лагевриог уухдаа анхаарах зүйлс?

1. Энэ эмийг хэрэглэх Үед хэт мэдрэг байдлын урвал, түүний дотор анафил акс гм мэдрэг шинж тэмдэг илэрч байсан. Хэрэв энэ эмийг хэрэглэсний дараа хэт мэдрэгшлийн урвал (чонон хөрвөс, тууралт, амьсгал давчдах гэх мэт) эсвэл анафилаксийн шинж тэмдэг илэрвэл энэ эмийг хэрэглэхээ даруй зогсоож, худалдаж авсан эмнэлгийн байгууллагад мэдэгдэж тохирох эмийн эмчилгээг эхлэх хэрэгтэй.
2. Энэ эмийг **жирэмсэн эхчүүд хэрэглэх боломжгүй**, нөхөн Үржихүйн насны эмэгтэйчүүд **жирэмсэн болоогүй гэдгээ баталгаажуулсны дараа** энэ эмийг ууна. Хэрэв та **жирэмсэн гэдгээ мэдэлгүй хэрэглэсэн бол даруй зогсоож, мэргэжлийн эмчид хандаарай**. Мөн MSD Korea (02-331-2000) компанитай холбогдож шууд лавлагаа, зөвлөгөө авах боломжтой.
3. Энэ эмийг ууж байхдаа **жирэмслэхээр төлөвлөж буй эмэгтэйчүүд** эм хэрэглэж байгаа **болон сүүлийн тунг хэрэглэснээс хойш 4 хоног**, хамтрагч (эхнэр)-тай **эрэгтэйчүүд 3 сар хүртэл жирэмслэлтээс хамгаалах Үр дүнтэй аргыг** хэрэглэнэ. Түүнчлэн, **хэрэв та хөхөөр хооллож байгаа бол энэ эмийг сүүлийн тунг хэрэглэснээс хойш 4 хүртэлх хоногийн хугацаанд хөхүүлэхээ болих** хэрэгтэй.
4. Эмчийн оношгүйгээр бусдад хэрэглүүлэх нь маш аюултай бөгөөд холбогдох хуулийн дагуу шийтгэгдэж болзошгүй. Хэрэв энэ эмийг хэрэглэсний дараа сөрөг нөлөө гарах зэрэг шинж тэмдгүүд гарсны улмаас эмийг зогсоовол Үлдсэн эмийг буцаах болон хаях арга хэмжээ авна.

♣ Ямар гаж нөлөө илэрч болох вэ?

		
Гүйлгэх	Дотор муухайрах	Толгой эргэх

* Эдгээр шинж тэмдгүүдээс гадна бусад гаж нөлөө илэрч болзошгүй бөгөөд хэрэв энэ эмийг хэрэглэсний дараа гаж нөлөө илэрвэл эм зүйч эсвэл жор авсан эмнэлгийн байгууллагад хандаж зөвлөгөө аваарай. Anda juga boleh melaporkan kesan sampingan kepada

Institut Keselamatan dan Pengurusan Risiko Ubat Korea (KIDS) menerusi talian penting (1644-6223).

- Дэлгэрэнгүй мэдээллийг БНСУ-ын Өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэх төвийн вэб сайт (www.kdac.or.kr) эсвэл орон нутгийн эрүүл мэндийн төвөөс авна уу.

