

Hướng dẫn sử dụng thuốc của 'Lagevrio'

Tên thuốc	Viên Lagevrio
Thành phần / Hàm lượng	(Thành phần hoạt chất) molnupiravir 200mg (mỗi 1 viên)
Đặc tính	Viên màu cam
Cách sử dụng / Liều lượng	- Ngày 2 lần, mỗi lần 4 viên, tổng cộng 10 lần trong 5 ngày. - Bắt đầu uống sau khi được chẩn đoán dương tính với COVID-19 trong vòng 5 ngày và kể từ khi bắt đầu có triệu chứng. - Trường hợp nhập viện khi đang uống thuốc thì sẽ theo quyết định của các y bác sĩ có tiếp tục uống thuốc này nữa hay không
Tác dụng / Hiệu quả	Điều trị bệnh nhân là người lớn đang mắc bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình có nguy cơ trở thành bệnh nhân bệnh nặng do nhiễm COVID-19 Tuy nhiên, chỉ có thể sử dụng cho những bệnh nhân không thể sử dụng các phương pháp điều trị COVID-19 khác hoặc về mặt lâm sàng các phương pháp điều trị corona khác không thích hợp.
Phương pháp bảo quản	Bảo quản trong phòng ở nhiệt độ 15 °C ~ 30

♣ Uống Lagevrio như thế nào?

Mỗi lần uống 4 viên, Một ngày 2 lần, trong 5 ngày ->

Uống tổng cộng 10 lần



- Có thể uống bất cứ lúc nào, nhưng **quan trọng là không được ngưng uống giữa chừng cho đến khi hoàn tất quá trình điều trị với tổng số 10 lần uống trong 5 ngày.**
- Không được bóc vỏ viên thuốc, nhai hoặc nghiền nát mà phải nuốt toàn bộ viên thuốc.**
- Phải uống thuốc cách nhau mỗi 12 tiếng , vì vậy, hãy định giờ cho lần uống đầu tiên vào lúc mà bạn dễ nhớ và phù hợp, thuận tiện với thói quen, giờ giấc sinh hoạt của mình ví dụ) 9 giờ sáng, / 9 giờ tối

♣ Phải làm sao trong trường hợp quên uống thuốc?

① Trường hợp quên uống thuốc trong vòng 10 tiếng	② Trường hợp quên uống thuốc quá 10 tiếng
- Uống ngay khi nhớ ra và uống và uống liều tiếp theo vào giờ đã định ban đầu - Sau đó giữ nguyên thời gian uống thuốc như ban đầu	- Bỏ qua liều đã quên và uống liều tiếp theo vào thời gian dự kiến - Sau đó giữ nguyên thời gian uống thuốc như ban đầu
(Không được uống gấp đôi lượng thuốc cùng một lần)	

♣ Cần phải lưu ý điều gì khi dùng thuốc Lagevrio?

1. Có những báo cáo bệnh nhân uống thuốc này gặp phản ứng quá mức bao gồm cả phản vệ. Trường hợp xuất hiện các triệu chứng và dấu hiệu phản ứng quá mức (nổi mào đay, phát ban, khó thở, v.v...) hoặc phản vệ sau khi dùng thuốc này thì phải ngừng sử dụng thuốc ngay và thông báo cho cơ sở y tế đã kê đơn để được bắt đầu nhận điều trị bằng thuốc phù hợp.
2. Thuốc này **không được dùng cho phụ nữ đang mang thai** nên phụ nữ có khả năng sinh **con bắt buộc phải xác nhận là không mang thai** trước khi sử dụng thuốc này. Giả sử, **trong trường hợp không biết mình mang thai và uống thuốc, hãy dừng thuốc ngay và hỏi ý kiến của chuyên gia y tế**; Đồng thời cũng có thể liên hệ với MSD Korea (02-331-2000) để được hỏi hoặc tư vấn trực tiếp.
3. **Phụ nữ dự định có thai** trong khi dùng thuốc này phải sử dụng **biện pháp tránh thai hiệu quả** trong thời gian uống thuốc và trong **4 ngày** sau khi uống liều **thuốc cuối cùng**; **nam giới** có bạn chung giường là người có khả năng mang thai (vợ) thì phải sử dụng **biện pháp tránh thai** tối thiểu **3 tháng**. Ngoài ra, **phụ nữ đang cho con bú** thì phải **ngừng cho con bú** tối thiểu trong **4 ngày** sau khi uống liều **thuốc cuối cùng**.
4. Rất nguy hiểm nếu đưa người khác sử dụng thuốc mà không có đơn thuốc chẩn đoán của bác sĩ và bạn có thể bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, nếu ngừng thuốc do xảy ra triệu chứng như các phản ứng bất thường, v.v... sau khi dùng thuốc thì phần thuốc còn lại sẽ được trả về để hủy bỏ

♣ Những tác dụng phụ nào có thể xảy ra?

		
Tiêu chảy	Buồn nôn	Chóng mặt

* Có thể gặp phải các tác dụng phụ khác ngoài các triệu chứng trên. Hãy liên hệ và hỏi dược sĩ hoặc cơ sở y tế cấp đơn thuốc nếu gặp phải các tác dụng phụ sau khi uống thuốc này. Ngoài ra, vui lòng liên hệ với Cơ quan Quản lý An toàn Dược phẩm Hàn Quốc (1644-6223) để được tư vấn về các tác dụng phụ đã xảy ra.

- Hãy truy cập trang web của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (www.kdac.or.kr) hoặc trạm y tế khu vực để biết thêm thông tin.

