

ラゲブリオ服薬説明書

製品名	ラゲブリオカプセル
成分/含量	(有効成分)モルヌピラビル(molnupiravir)200mg(1カプセル当たり)
性状	オレンジ色のカプセル
用法/用量	1日2回、1回4カプセルを5日間、計10回服用。 - 新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、症状の発現後5日以内に投与開始 - 服用中に入院する場合、薬物服用の継続は医療陣の決定に従う。
効能/効果	新型コロナウイルス感染症と診断された患者で、重症に進行する危険性の高い軽症および中等度の成人患者の治療 ただし、他の新型コロナウイルス感染症治療剤を使用できなかったり、他の新型コロナウイルス感染症治療剤が臨床的に適切でない患者に限り使用
保存方法	15℃~30℃室温保管

♣ ラゲブリオカプセルはどのように服用しますか？

一度に4カプセル服用, 1日2回5日間 -> 計10回服用



- 食事に関係なく服用可、5日間で計10回分を中断せずに服用して治療過程を完了することが重要です。
- そのまま飲み込み、カプセルを開けたりつぶしたりしてはいけません
- 12時間おきに服用しなければならないので、初回の服用時間を生活習慣上忘れずに服用しやすい時間に決めてください。例)午前9時、/午後9時

♣ 薬の服用を忘れた場合、どうすればいいですか？

① 服用を忘れて10時間以内の場合	② 服用を忘れて10時間以上の場合
- 思い出したらすぐ服用し、次回は決まった時間に服用 - 以後、服用時間どおりに維持	- 服用しなかった用量は飛ばして、次の服用予定時間に普段の用量を服用 - 以後、服用時間どおりに維持
(一度に2倍の用量を服用しないでください。)	

♣ ラゲブリオ服用時の注意事項は何ですか？

1. この薬を使用する間、アナフィラキシーを含む過敏反応が報告されています。もし、この薬を服用した後、過敏反応(蕁麻疹、発疹、呼吸困難など)またはアナフィラキシーの兆候および症状が現れたら、直ちに投与を中断して処方された医療機関に知らせ、適切な薬物治療を始めなければなりません。
2. この薬は**妊婦に使用できない薬物**で、妊娠可能な女性は**必ず妊娠ではないことを確認**して、この薬を服用しなければなりません。もし、**妊娠の事実を知らずに服用した場合、直ちに服用を中断し、医療専門家と相談**してください。また、韓国MSD(株)(02-331-2000)にも直接問い合わせまたは相談することができます。
3. この薬を服用する間、**妊娠を計画している女性**は服用中および**最後の服用後4日**、妊娠可能なパートナー(配偶者)がいる**男性**は**3ヶ月**まで**効果的な避妊法**を使用しなければなりません。また、**母乳授乳中の方は**、この薬を服用中、**最後の服用後4日までは授乳を中断**しなければなりません。
4. 医師の診断処方なしに他人に投薬することは非常に危険であり、関連法上処罰されることがあります。この薬を服用した後、異常反応などの症状発生により投薬を中止した場合、残りの治療剤は返却廃棄が原則です。

♣ 発生し得る副作用は何ですか？

		
下痢	むかつき	めまい

*このような症状以外にも、他の副作用がでることがあり、この薬を服用した後に副作用が現れたら、まず調剤薬剤師または処方された医療機関に連絡して相談してください。また、韓国医薬品安全管理院にも発生した副作用を相談電話(1644-6223)でご連絡ください。

- その他にもご不明な点がありましたら、疾病管理庁のホームページ(www.kdac.or.kr)または地域の保健所を訪問してください。