

'LAGEVRIO服药说明书

产品名称	LAGEVRIO胶囊
成份/含量	(有效成份)莫纳皮拉韦(molnupiravir)200mg(一粒)
性状	朱黄色胶囊
用法/用量	- 一日两次，一次服用四粒胶囊，连续服用五天(共十次)。 - 新型冠状病毒肺炎呈阳性，出现症状后五天之内开始服用。 - 若在服药期间住院，则是否继续服药遵从医疗人员的决定。
药理作用/效果	治疗确诊新型冠状病毒肺炎的患者中重症风险较高的轻症及普通型成人患者注意，仅限为不能使用其他新型冠状病毒肺炎治疗药物或在临床上不适合使用其他新型冠状病毒肺炎治疗药物的患者使用。
保存方法	15°C~30°C常温保存

♣ 如何服用LAGEVRIO胶囊？

一次服用四粒，一日两次，连续服用五天 -> 共服用十次



- 服药与进食无关，重要的是五天(共十次)**不中断连续服用完成治疗过程**
- 应整粒吞服，**不要打开或碾碎胶囊服用**。
- 需要每隔12小时服用一次，请根据自己的生活习惯把第一次的服药时间定在不容易忘记且适合服药的时间。 例如)上午9点/下午9点

♣ 忘记服药时应怎么办？

① 忘记服药不超过10小时	② 忘记服药超过10小时
- 意识到忘记服药时立即服用，下一次服药按照原定时间服用。 - 之后保持原定服药时间。	- 跳过该次服药，下一次服药按照原定时间以正常用量服用。 - 之后保持原定服药时间。
(不要一次服用两次用量。)	

♣ 服用LAGEVRIO都有哪些注意事项？

- 1.据报告，该药曾出现过过敏反应。若服药后出现过敏反应(发疹、呼吸困难等)或过敏征兆和症状，则应立即停止服药，并通知开处方的医疗结构接受恰当的药物治
疗。
- 2.该药**不能用于孕妇**，育龄女性**必须确认是否怀孕**后再服药。若在**不知道怀孕的情况下服药**，则请**立即停止服药**，并向**医疗专家咨询**。此外，还可以直接向韩国MSD株式会社(02-331-2000)咨询。
- 3.**备孕女性**应在服药期间和**最后一次服药后的四天里**、有育龄伴侣(配偶)的**男性**应在服药期间和服药后的**三个月里**采取**有效的避孕方法**。**正在哺乳的妇女**应到**最后一次服药后的第四天为止**停止哺乳。
- 4.没有医生的诊断处方给他人服药非常危险，可能按照相关法律受到处罚。若因服药后发生不良反应等症状而停止服用，则剩余的**药物原则上应退回废弃**。

♣ 可能发生副作用都有哪些？

		
腹泻	恶心	眩晕

* 除了这些症状外，还有可能出现其他副作用。若服药后出现副作用，则请联系配药的药剂师或开处方的医疗机构进行咨询。同时，请联系韩国医药品安全管理局(咨询电话：1644-6223)告知出现的副作用。

- 其他疑问事项请访问疾病管理厅网站(www.kdac.or.kr)或向地区保健所咨询。

