

เอกสารแนะนำการใช้ยา 'ลาเกอร์โอ'

ชื่อผลิตภัณฑ์	แคปซูล Lagevrio
ส่วนประกอบ / ปริมาณ	(ส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์) โมลนูพิราเวียร์ (molnupiravir) 200mg. (ต่อ 1 แคปซูล)
คำอธิบาย	แคปซูลสีส้ม
วิธีการใช้ / ปริมาณยา	- รับประทานวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 4 แคปซูล เป็นเวลา 5 วัน รวมทั้งหมด 10 - เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 ให้เริ่มรับประทานยาภายใน 5 วันหลังจากมีอาการ - หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลขณะรับประทานยานี้อยู่ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ยาต่อไปหรือไม่
ประสิทธิภาพ / ผลที่ได้รับ	รักษาผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 ผ่านการตรวจแบบ PCR ฯลฯ ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยและอาการปานกลางที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงขึ้น แต่สามารถใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้อายูราคานา COVID-19 อื่น ๆ หรือยารักษาแบบอื่นที่ไม่เหมาะสม ทางคลินิกได้
วิธีการเก็บรักษา	เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง (15°C-30°C)

♣ ต้องทานยา "ลาเกอร์โอ" อย่างไร?

รับประทาน 4 แคปซูลพร้อมกันในครั้งเดียว, วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน ->
รับประทานทั้งหมด 10 ครั้ง



- สามารถรับประทานยาได้โดยไม่ต้องทานตามเวลามื้ออาหาร และสิ่งสำคัญคือ รับประทานยาอย่างต่อเนื่องทั้งหมด 10 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน
- กลืนลงไปทั้งเม็ด ห้ามเปิด ทบหรือบดแคปซูล
- เนื่องจากต้องทานยาทุก 12 ชั่วโมง ดังนั้นควรกำหนดเวลาครั้งแรกที่จะทาน ลาที่สะดวกตามชีวิตประจำวันของคุณ เช่น) ช่วงเช้า 9 นาฬิกา/ ช่วงบ่าย 21 นาฬิกา

♣ หากลืมรับประทานยาต้องทำอย่างไร?

☞ หากลืมรับประทานยายังไม่เกิน 10 ชั่วโมง	☞ หากลืมรับประทานยาเกิน 10 ชั่วโมง
- รับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แล้วรับประทานยาครั้งต่อไปตามกำหนดเวลาเดิม - หลังจากนั้นให้รักษาเวลาในการทานยาตามเดิม	- ให้ดยาในตอนนั้นไป แล้วค่อยรับประทานยาในครั้งถัดไปตามเวลาที่กำหนด - หลังจากนั้นให้รักษาเวลาในการทานยาตามเดิม
(ห้ามรับประทานยาเป็นปริมาณ 2 เท่าในครั้งเดียว)	

♣ ข้อควรระวังขณะรับประทานยาลาเกอร์โอคืออะไร?

1. มีรายงานการเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลันถึงภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันในคนที่ใช้ยาที่มีแวนิลามและแสดงอาการของปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลัน(เช่นลมพิษผื่นหายใจลำบาก)หรือเกิดภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันรับประทานยาให้หยุดใช้ยานี้ทันทีและแจ้งหน่วยงานแพทย์ที่เป็นผู้จ่ายยาเพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาตัวใหม่ที่เหมาะสม
2. ยานี้ไม่สามารถใช้กับสตรีมีครรภ์ได้สตรีที่อยู่ในช่วงที่สามารถตั้งครรภ์ได้จะต้องรับประทานยานี้หลังจากยืนยันว่าไม่มีการตั้งครรภ์เท่านั้น หากรับประทานยาโดยที่ไม่รู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ ให้หยุดใช้ยาทันทีแล้วปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อ MSD Korea (02-331-2000) เพื่อสอบถามหรือขอคำปรึกษาได้โดยตรง
3. ขณะที่กำลังรับประทานยานี้ ผู้หญิงที่กำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ ขณะรับประทานยาและ 4 วันหลังจากรับประทานยาครั้งสุดท้าย ผู้ชายที่มีคู่ครอง (คู่สมรส) ที่อยู่ในช่วงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ ควรใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพเป็นเวลา 3 เดือน และผู้ที่กำลังให้นมบุตร ควรหยุดให้นมบุตรเป็นเวลา 4 วัน นับจากการรับประทานยาครั้งสุดท้าย
4. การจ่ายยาให้ผู้อื่นโดยไม่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์นั้น ถือเป็นอันตรายเป็นอย่างมากและอาจได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหลักการแล้ว หากหยุดใช้ยาเนื่องจากอาการต่าง ๆ เช่น อาการไม่พึงประสงค์หลังจากรับประทานยานี้ ยารักษาที่เหลือจะถูกส่งคืนและนำไปกำจัดทิ้ง

♣ ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง?

		
ท้องร่วง	คลื่นไส้	เวียนศีรษะ

* นอกจากอาการเหล่านี้แล้ว อาจมีผลข้างเคียงอื่น ๆ อีกหากมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นหลังจากรับประทานยานี้ ให้ติดต่อขอปรึกษาหรือหน่วยงานแพทย์ที่สั่งยาเพื่อขอคำแนะนำก่อน สามารถรายงานผลข้างเคียงอื่น ๆ นอกเหนือจากอาการที่เกิดขึ้นไปยัง Korea Institute of Drug Safety and Risk Management เบอร์ (1644-6223)

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Korea Disease Control and Prevention Agency (www.kdac.or.kr) หรือไปยังอนามัยในพื้นที่

