

Notice d'information du patient pour "Lagevrio"

Nom du produit	Lagevrio Gélule
Ingrédients / Contenu de la boîte	(Ingrédient actif) Molnupiravir 200 mg (par gélule)
Description	Gélules orange
Indications / Dosage	- Prenez 4 gélules, 2 fois par jour, pour un total de 10 prises sur 5 jours. - Commencer le traitement dans les 5 jours suivant l'apparition des symptômes, après confirmation de COVID-19. - Si vous êtes hospitalisé pendant que le traitement est en cours, le personnel médical déterminera si le traitement doit être poursuivi.
Effets / Bénéfices	Traitement préconisé contre le COVID-19 confirmé par test PCR avec des symptômes légers à modérés, présentant un risque élevé de développer des symptômes graves. Prenez garde à n'administrer ce traitement qu'aux personnes qui ne peuvent pas utiliser d'autres traitements contre le COVID-19 ou qui ne sont pas cliniquement aptes à prendre d'autres traitements contre le COVID-19.
Conservation	Conserver à température ambiante (15°C-30°C)

♣ Comment prendre Lagevrio?

Prenez les 4 gélules ensemble, 2 doses par jour pendant 5 jours -> Un total de 10 doses



- Les doses peuvent être prises entre les repas, et il est important de **prendre le traitement en entier** pour un traitement complet de 10 doses réparties sur 5 jours **sans interruption**.
- Ne pas croquer ou couper les gélules**. Avaler les gélules en entier.
- Les doses doivent être prises à intervalles réguliers de 12 heures, assurez-vous donc de prendre la première dose à un moment qui corresponde à votre mode de vie. Ex) 9h00/21h00

♣ Que faire si j'oublie de prendre mes comprimés?

① Si moins de 10 heures se sont écoulées depuis que vous avez oublié de prendre le traitement :	② Si plus de 10 heures se sont écoulées depuis que vous avez oublié de prendre le traitement :
- Prenez la dose prescrite dès que vous vous rendez compte de l'oubli et prenez la dose suivante à l'heure initialement fixée. - Maintenir l'horaire initial du traitement par la suite	- Ne prenez pas les comprimés au moment où vous vous rendez compte de l'oubli ; prenez-les à l'horaire initialement prévu pour la dose suivante. - Maintenir l'horaire initial du traitement par la suite
(Na pas doubler la dose.)	

♣ Quels sont les précautions et avertissement à prendre en compte avant de prendre Legvrio?

1. Des réactions d'hypersensibilité, y compris l'anaphylaxie, ont été signalées chez des personnes ayant pris ce médicament. Si vous présentez des signes et des symptômes de réactions d'hypersensibilité (c'est-à-dire palpitations, éruptions cutanées, essoufflement) ou d'anaphylaxie après avoir pris ce médicament, arrêtez immédiatement le traitement et informez l'établissement médical pour prescription d'un traitement approprié.
2. Ce médicament **ne peut pas être administré aux femmes enceintes** et les femmes potentiellement enceintes doivent prendre ce médicament **après confirmation d'absence de grossesse**. Si vous avez pris ce médicament **sans savoir que vous êtes enceinte, arrêtez immédiatement le traitement et consultez un médecin**. Vous pouvez également contacter ou consulter MSD Korea (02-331-2000).
3. Pendant le traitement, **les femmes qui envisagent de tomber enceinte** doivent utiliser une contraception efficace pendant toute la durée du traitement et **jusqu'à quatre jours après la prise de la dernière dose**, et les hommes ayant une partenaire (conjointe) en âge de procréer doivent utiliser **un mode de contraception efficace jusqu'à trois mois après la prise de la dernière dose**. De plus, **les mères qui allaitent** doivent **arrêter d'allaiter** pendant le traitement et **jusqu'à 4 jours après la prise de la dernière dose** de ce médicament.
4. Donner des médicaments prescrits par un médecin à une autre personne sans l'approbation d'un médecin est très dangereux. Cela peut être passible de sanctions en vertu des lois applicables. En règle générale, si le traitement est arrêté en raison de symptômes tels que des réactions

anormales après la prise des comprimés, les comprimés restants doivent être retournés en pharmacie et détruits.

♣ **Quels sont les effets secondaires possibles?**

		
Diarrhée	Nausée	Vertiges

* En plus des symptômes ci-dessus, il peut y avoir d'autres effets secondaires. Si vous ressentez des effets indésirables après avoir pris ce médicament, contactez votre pharmacien ou votre établissement médical pour consultation. Vous pouvez également

signaler les effets secondaires à l'Institut coréen de la sécurité des médicaments et de la gestion des risques (KIDS) via la hotline (1644-6223).

- Pour signaler tout effet secondaire à l'Institut coréen de la sécurité des médicaments et de la gestion des risques (KIDS) ou contactez la hotline (1644-6223).

