

"Lagevrio" Manwal na Pangangasiwa

Pangalan ng produkto	Lagevrio na Kapsula
Mga Sangkap/ Nilalaman	(Aktibong Sangkap) Molnupiravir 200mg(kada kapsula)
Paglalarawan	Orange na Kapsula
Direksiyon/ Dosis	- Uminom ng 4 na kapsula, 2 dosis kada araw sa kabuuang 10 dosis sa 5 araw. - Mag-umpisa ng paggagamot sa loob ng 5 araw mula sa pagsimula ng sintomas, pagkatapos makumpirma ang Covid-19. - Kung ikaw ay naospital sa panahon ng paggagamot, ang pagpapatuloy ng pag-inom ng gamot ay tutukuyin ng medikal na kawani.
Epekto/ Benepisyu	Ang paggamot sa COVID-19 na kumpirmadong indibidwal sa banayad at katamtamang sintomas na may mataas at pabanganib na magdevelop ng malalang sintomas. Gayunpaman, ang gamitin lamang ng pasyente na di makagamit sa COVID-19 na paggamot o ang mga hindi nagagamot sa klinika na maaaring natatama para sa COVID-19 na paggagamot.
Pag-imbak	Mag-imbak sa temperatura ng kwarto (15°C-30°C)

♣ Paano ako iinum ng Lagevrio?

Inumin lahat ang 4 na kapsula ng sabay sabay, 2 dosis kada 1 araw para sa 5 araw -> Sa kabuuang 10 dosis



- Maaring inumin ito ng kahit hindi kumain ng kanin, at ang importante at **makumpleto ang paggagamot** sa kabuuang 10 dosis sa loob ng 5 araw ng **walang gambala.**
- Huwag nguyain o hatiin ang tableta.** Lunukin ang tableta ng buo.
- Ang dosis ay kailangang inumin at regular na pagitan ng 12 oras, kaya siguraduhin na iset ito sa unang dosis at sa panatag na oras sa pamamagitan ng iyong pamumuhay. Hal.) alas nuebe ng umaga/alas nuebe ng gabi(9:00 AM/9:00 PM)

♣ Paano kung nakalimurtan kung uminom ng gamot sa oras?

① Kapag mag maiksi sa 10 oras ang lumipas mula sa iskedyul na oras ng paginom ng gamot.	② Kung mahigit ng 10 oras ang lumipas mula sa oras ng iskedyul para uminom ng gamot.
- Uminom ng gamot pagka- alala ng pagliban, at inumin ang susunod na dosis sa orihinal na oras. - Pagkatapos imentena ang oras ng pag-inom ng gamot	- Huwag uminom ng gamot kung lumagpas sa oras at uminom sa tamang oras para sa susunod na dosis. - Panatilihin ang orihinal na oras ng gamot pagkatapos.
(Huwag doblehin ang dosis)	

♣ Ano ang mga pag-iingat na kinakailangang ingatan sa pag-inom ng Lagevrio?

1. Hypersentitive ang reaction, kasama ang anaphylaxis, ay nirereport mula indibidwal na uminom ng medikasyon. kapag nagkaroon ng signal at sintomas ng hypersensitive reaction (i.e. palpitations, mga pantal, paghihina ng hininga) o anaphylaxis pagkatapos uminom ng gamot, kaagad na huminto sa pag-inom at iulat sa institusyong medikal para umpisahan ang natatamang paggagamot.
2. Ang paggagamot ay **hindi maaring ipapainom sa babaeng buntis** at ang potential na babaeng buntis ay kailangang uminom **pagkatapos makumpirma na hindi buntis**. Kapag uminom ka ng gamot at **di mo alam na ikaw ay buntis, agad agad na huminto sa pag-inom at kumunsulta sa personel** ng medical. Bilang kahalili, maari mong tawagan at magpakunsulta sa MSD Korea (02-331-2000).
3. Sa panahon ng paggagamot, kapag **ang babae ay nagpaplano sa pagbubuntis** ay kailangang gumamit ng contraceptive **sa panahon ng paggagamot hanggang 4 na araw pagkatapos ng huling dosis** at sa lalake na may asawa na nasa wastong edad sa pagdadala ng bata ay kailangang gamitin ang **epektibong contraceptive hanggang 3 buwan**. At saka, **ang nagpapasuso na nanay** ay kailangang **mahinto ang pagpapasuso sa panahon ng paggagamot at hanggang 4 na araw makalipas ng huling dosis** ng pagpapagamot.
4. Ang pag-inom ng gamot na walang reseta ng doktor ay mapanganib. Kapag ginagawa ito maaaring magkakaroon ng multa na related sa batas. Sa prinsipyo, kapag mahihinto ang pag inom ng gamot dahil sa sintomas kagaya ng abnormal na reaksiyon pagkatapos inumin, ang natitirang kapsula ay kailangang ibalik at itapon.

♣ Ano ang mga posibleng epekto?

		
Pagtatae	Pagduduwal	Pagkahilo

* Para sa karagdagan ng nakalahad na sintomas sa itaas, maaaring mayroon ding ibang masamang epekto. Kung nakaranas ka ng anumang mga masamang epekto pagkatapos uminom ng ganitong gamot, tawagan ang institusyong medikal para sa konsultasyon. Maari ka ring mag-ulat ng mga side effect sa

Korea institute ng kaligtasan ng droga at pamamahala ng panganib(KIDS) sa hotline(1644-6223)

- Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa opisyal na Website ng Ahensiya ng pagkontrol at pag-iwas sa sakit sa korea (www.kdac.or.kr) o kaya sa lokal na sentro ng pangkalusugan.

