




콘돔 사용을
제대로

HIV/AIDS,

성매개감염병

감염 위험을

제로로



감염 사실을 빠르게 확인하면

- 빠른 치료
- 타인에 대한 감염 예방
- 감염에 대한 불안감 해소



보건소에서 무료·익명 검사가 가능합니다.

에이즈 상담센터



1551-8105

의심 증상이 있을 경우
신속히 상담 및 검사

감염병이 궁금하다면?

질병관리청 콜센터



감염병 관련 정보 및
상담서비스 제공




질병관리청 홈페이지



감염병 관련
정보 제공



예방과 실천은 **제대로**,
감염 위험은 **제로로**



위험한 성접촉을 하지 않는 것이
가장 확실한 예방입니다!



익명·즉석만남 파트너,
성매매를 통한
성접촉 하지 않기



성관계 시
올바른
콘돔 사용하기



혈액접촉이
일어날 수 있는
성관계 하지 않기



의심 시
빠른 검사 받기



치료기간 동안
성관계 자제하기



감염 시
상대자도 함께
검사·치료 받기

이해를 제대로 오해를 제로로

HIV

(Human Immunodeficiency Virus)

인체면역결핍바이러스

- **감염의 원인**이 되는 바이러스
- HIV를 가지고 있는 사람은 'HIV 감염인'

AIDS

(Acquired Immune Deficiency Syndrome)

후천성면역결핍증

- **HIV 감염으로 인한 면역세포 파괴로 면역체계가 손상**되어 각종 감염증, 암 등 질환이 나타나는 상태
- 이러한 질환이 진행된 사람은 '에이즈 환자'

※ HIV 감염을 조기에 발견하여 꾸준히 치료하면 에이즈 환자로 진행되는 것을 막을 수 있음!

STI

(Sexually Transmitted Infection)

성매개감염병

성접촉을 통해 전파되는 감염성 질환으로, 세균 감염이나 바이러스 감염이 주 원인입니다.

세균 감염 매독, 임질, 클라미디아감염증, 연성하감 등

바이러스 감염 성기단순포진, 첨규콘딜롬, 사람유두종바이러스(HPV) 감염증 등

예방을 제대로 감염을 제로로



HIV/AIDS, 성매개감염병 어떻게 감염되나요?

**HIV/AIDS, 성매개감염병은
일상접촉으로 감염되지 않습니다.**



HIV/AIDS, 성매개감염병 감염경로를 확인하세요!



검사를 제대로 불안을 제로로



HIV/AIDS, 성매개감염병, 조기 발견·신속한 치료가 최선입니다!

학교 밖 청소년 무료 건강검진 안내

- 검진대상** 9세~18세 학교 밖 청소년
검진항목 기본검진(혈액검사 등), 선택검진(매독, 임질, 클라미디아감염증, HIV), 확진검진(매독 등)

건강검진은 언제 받을 수 있나요?

- 학교 밖 청소년 건강검진이**
처음이라면 연중 언제든지
검사 받은 적이 있다면 검사일로부터 3년 후

건강검진은 어떻게 받을 수 있나요?

- 신청서 접수**
가까운 학교 밖 청소년 지원센터로 방문, 우편, 이메일 신청
- 건강검진표 발송**
국민건강보험공단에서 검진대상자에게 건강검진표 및 검진안내 카카오톡 알림톡 발송
- 건강검진 실시**
학교 밖 청소년 검진기관에 건강검진 예약
*검진 전날 저녁 9시 이후 금식 후 검진 실시
- 검진결과 통보**
검진 후 15일 이내 등록된 주소지로 건강검진 결과 통보서 우편발송

치료는 어떻게 해야 하나요?

저소득층 청소년은 학교밖청소년지원센터에 상담 후 위기청소년 특별지원사업을 통해 지원받을 수 있습니다.

보건소 검사방법 안내

- 검진대상** 검사 희망자 누구든지
검진항목 성매개감염병(매독, 임질, 클라미디아 감염증)*, HIV
* 검진항목은 보건소에 따라 다를 수 있음

검사는 언제 해야 하나요?

HIV/AIDS

감염 의심일로부터
약 4주 이후 검사

성매개감염병

증상 발현 시 or 감염 의심 시
검사

- HIV/AIDS: 간접검사(신속검사) 방법으로 검사하여 검사결과가 음성으로 나온 경우, 감염 노출 의심일로부터 **12주 후** 재검사 실시

검사는 어떻게 하나요?

- 보건소 방문 전** 검진항목 등 문의
- 보건소 방문 후** 접수 ▶ 검체 채취* ▶ 검사
*검체 채취: (HIV) 혈액, (성매개감염병) 혈액·소변 등
- 귀가 후** 유선 등으로 검사결과 안내받기

치료는 어떻게 해야 하나요?

HIV/AIDS

체내 HIV 양 감소를 위한
항레트로바이러스 요법

성매개감염병

항생제 또는 항바이러스제

- HIV/AIDS: HIV는 완치법이 없으나, HIV 치료제를 복용하면 대부분 6개월 이내에 바이러스 억제 가능
- 성매개감염병: 치료받지 않으면 불임, 만성 통증, 임신부의 경우 태아에게 치명적인 영향을 줄 수 있음