

HIV/AIDS란?

HIV

(Human Immunodeficiency Virus)

인체면역결핍바이러스

- **에이즈의 원인**이 되는 바이러스
- HIV를 가지고 있는 사람은 'HIV 감염인'

AIDS

(Acquired Immune Deficiency Syndrome)

후천성면역결핍증

- **HIV 감염으로 인한 면역세포 파괴로 면역체계가 손상**되어 각종 감염증, 암 등 질환이 나타나는 상태
- 이러한 질환이 진행된 사람은 '에이즈 환자'

성매개감염병이란?

STI

(Sexually Transmitted Infection)

성매개감염병

성접촉을 통해 전파되는 염증 및 감염성 질환으로, 세균 감염이나 바이러스 감염이 주 원인입니다.

세균 감염 | 매독, 임질, 클라미디아감염증, 연성하감 등

바이러스 감염 | 성기단순포진, 침균콘딜롬, 사람유두종바이러스(HPV) 감염증 등

HIV/AIDS, 성매개감염병 감염 경로와 예방 수칙

어떻게 감염되나요?



감염인과의
안전하지 않은 성접촉



감염인이 사용한
주사기 공동사용



수직감염
(감염된 여성의 임신, 출산, 모유 수유)



감염된
혈액 수혈

감염 예방을 위한 4가지 약속!



익명, 성매매 등
위험한 성접촉 하지 않기



성관계시
콘돔 사용하기



의심되면 바로 검사받고,
진단되면 즉시 치료받기



성접촉 상대자도
검사받도록 안내하기

에이즈 상담센터



1551-8105

이용방법

- **대상:** 에이즈에 대한 정보 제공 및 상담을 원하는 사람은 누구든지
- **운영시간:** 월~금, 11:00~20:00
- **사용방법:** 전화상담(1551-8105), 방문상담, 인터넷상담(카카오톡, 네이버지식)

24시간 마약류 전화상담센터



1342

약물 문제가 있다면
망설이지 말고 전화하세요!
*익명·비밀 보장

이용방법

- **대상:** 마약류 사용자, 사용자의 가족 및 지인 등 마약류로 인해 고민이 있는 국민 누구나
- **운영시간:** 연중무휴(24시간, 연 365일)
- **사용방법:** 1342
(당신의 일상 **13** + 24시간 사이 **42**)

감염병 및 치료센터가 궁금하다면?

질병관리청 콜센터



감염병 관련 정보 및
상담서비스 제공

질병관리청 홈페이지



감염병 관련 정책 정보,
연구 자료 등 제공

한국마약퇴치운동본부



마약류 중독으로
도움이 필요한 국민 지원

예방과 실천은 제대로 감염과 전파는 제로로

마약류 등 약물 사용자들은
HIV/AIDS, 성매개감염병에 감염될 위험이 높습니다.



- 주사기는 반드시 1회용을 사용하고, 재사용하거나 공유하지 않습니다.
- 정기적인 검사를 통해 자신의 성건강을 확인합니다.
- 예방수칙을 제대로 알고 꾸준히 실천하는 것이 중요합니다.



보건복지부



질병관리청



한국마약퇴치운동본부

예방으로 위험 ZERO

약물 사용과 관계 없이 누구나
HIV/AIDS, 성매개감염병으로부터 자신을 보호할 권리가 있습니다.

약물 사용 – HIV/AIDS, 성매개감염병 어떤 연관이 있을까요?

주사기(주사바늘 등) 공동 사용

약물 주사 시 사용된 주사기를 공유하는 것은
HIV, 매독 등 혈액 매개 감염병을 전파하는
가장 흔한 경로!

약물의 영향으로 판단력 저하

- 안전한 성접촉에 대한 판단력 저하로
소홀한 콘돔 사용 가능성 UP
- HIV/AIDS, 성매개감염병의 원인이 되는
위험한 성접촉* 가능성 UP

* 위험한 성접촉이란?



※ 위험한 성접촉을 하지 않는 것이 HIV/AIDS, 성매개감염병 감염을 막는 가장 확실한 예방법입니다.

HIV/AIDS, 성매개감염병 예방을 위해 이것만은 꼭 지켜주세요!

주사기 및 도구의 안전한 관리 및 사용



- 약물 주사 시, 항상 새 주사기와 바늘 사용!
- 사용한 주사기는 **안전하게 폐기!**
- 재사용 or 타인과 공유 금지!
- 약물 준비 시 사용하는 모든 도구는 **청결하게 관리!**

안전한 성생활 실천


올바른 콘돔 사용은 예방에 가장 효과적입니다.
※ 콘돔은 누구나 편의점, 약국에서 구매할 수 있습니다.

정기적인 검사

약물사용자들은 HIV/AIDS, 성매개감염병
감염 위험이 높으므로 증상이 없더라도
정기적으로 검사를 받는 것이 중요합니다.
※ 약물 사용 빈도가 높다면, 정기적인 검사는 필수!

필요시 도움요청하기 “함께한걸음센터”

- 지원 내용: 마약류 중독 사회재활



- 대상: 마약류(마약, 대마, 항정신성의약품) 중독으로 도움이 필요한 모든 사람
- 운영시간: 월~금, 09:00~18:00
- 장소: 전국 **함께한걸음센터**(17개소)

검사로 불안 ZERO

HIV/AIDS, 성매개감염병,
조기 발견·신속한 치료가 최선입니다!

감염 여부 및 증상이 의심될 땐,
즉시 검사 받으세요!

검사기관

HIV/AIDS

보건소 또는 병원
(감염내과 등)

성매개감염병

보건소 또는 병원
(비뇨의학과, 산부인과 등)

- HIV/AIDS: 보건소에서 무료·익명 검사 가능
- 성매개감염병: 일부 보건소에서 유료·실명으로 검사할 수 있으므로
보건소 방문 전 확인 필요

보건소에서 무료·익명 검사가 가능합니다.

검사시기

HIV/AIDS

감염 의심일로부터
*약 4주 이후 검사 권장

성매개감염병

증상 발현 or 감염 의심 시
검사 권장

- HIV/AIDS: 간이검사(신속검사) 방법으로 검사한 경우,
감염 의심일로부터 12주 후 검사 권고

감염 사실을 빠르게 확인하면

- 빠른 치료로 건강한 일상을 누릴 수 있습니다.
- 타인에 대한 감염을 예방할 수 있습니다.
- 감염에 대한 막연한 불안감을 해소할 수 있습니다.

팩트체크로 편견 ZERO

HIV/AIDS, 성매개감염병,
일상접촉으로는 감염되지 않습니다.



“HIV 감염인이 꾸준히 치료약을 복용하면”
바이러스가 검출되지 않아
타인에게 바이러스를 전파시키지 않습니다.

