

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2025. 9. 24.(수) 통권 제310호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료

01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 35,823건, 수두 22,445건, 성홍열 9,751건, 백일해 5,537건, 유행성 이하선염 5,209건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,897건, 성홍열 992건, 수두 921건, C형간염 350건, 유행성 이하선염 296건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 9. 23.(화) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~38주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 38주차 인천광역시 감염병은 총 139건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 35주~2025년 37주) 평균(170건) 대비 31건 감소함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 70건, 수두 22건, 성홍열 19건, 유행성 이하선염 9건, 말라리아 5건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국				
		2025				동기간대비 (1-38주)				동기간대비 (1-38주)				
		38주	37주	36주	35주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균	
1급	보툴리눔독소증													0
2급	수두	22	24	14	34	921	864	▲ 57	815	22,445	22,282	▲ 163	18,294	
	홍역					2	2	- 0	1	69	47	▲ 22	24	
	장티푸스					1	2	▼ 1	1	24	23	▲ 1	28	
	파라티푸스						1	▼ 1	1	13	11	▲ 2	17	
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	49	32	▲ 17	30	
	장출혈성대장균감염증				2	26	10	▲ 16	12	381	202	▲ 179	213	
	A형간염					45	50	▼ 5	140	829	882	▼ 53	1,860	
	백일해		1		1	266	2,793	▼ 2,527	612	5,537	22,303	▼ 16,766	5,583	
	유행성이하선염	9	3	7	8	296	261	▲ 35	292	5,209	4,992	▲ 217	5,492	
	수막구균 감염증									8	16	▼ 8	7	
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1	
	폐렴구균 감염증					21	26	▼ 5	23	327	344	▼ 17	282	
	한센병									2	3	▼ 1	2	
	성홍열	19	12	12	19	992	398	▲ 594	291	9,751	4,407	▲ 5,344	3,113	
	VRSA 감염증					1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	1	
	CRE 감염증	70	112	114	94	2,897	2,654	▲ 243	2,231	35,823	30,867	▲ 4,956	26,613	
	E형간염		1	1		21	33	▼ 12	21	617	533	▲ 84	453	
3급	파상풍					2	4	▼ 2	2	17	23	▼ 6	18	
	B형간염	1				12	16	▼ 4	15	185	180	▲ 5	237	
	일본뇌염										7	▼ 7	4	
	C형간염	4	11	13	2	350	395	▼ 45	456	4,183	4,812	▼ 629	5,714	
	말라리아	5	2	9	3	100	108	▼ 8	79	542	579	▼ 37	473	
	레지오넬라증					18	26	▼ 8	22	387	325	▲ 62	328	
	비브리오패혈증					1	2	▼ 1	2	30	28	▲ 2	32	
	발진열					2	7	▼ 5	2	9	31	▼ 22	11	
	쯔쯔가무시증					1	3	▼ 2	5	228	1,008	▼ 780	741	
	렙토스피라증									1	32	▼ 34	46	
	브루셀라증									0	5	- 0	5	
	신증후군출혈열					3	2	▲ 1	2	124	192	▼ 68	166	
	CJD/vCJD					3	6	▼ 3	3	44	45	▼ 1	47	
	뎅기열		1			10	11	▼ 1	7	81	152	▼ 71	82	
	큐열					1	1	- 0	1	51	47	▲ 4	44	
	라임병						1	▼ 1	2	23	24	▼ 1	18	
	유비저									4	1	▲ 3	2	
	치쿤구니아열									4	4	- 0	5	
	중증열성혈소판감소증후군					1	2	▼ 1	1	179	107	▲ 72	131	
	지카바이러스감염증									3		▲ 3	1	
	옴폭스									16	13	▲ 3	15	
	매독	3	4	3	3	128	116	▲ 12	122	1,653	2,016	▼ 363	1,835	
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	10	9	▲ 1	10	

- 38주차(2025. 9. 14. ~ 2025. 9. 20.) 전수감시 신고 현황은 2025. 9. 23(화) 질병관리청 감염병포털 감염병통계자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 옴폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트니일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 37주차 병원급 의료기관(221개소) 코로나19 입원환자는 460명으로 전주(433명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년							
	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	139	220	272	302	367	406	433	460

2024-2025년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 37주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 25명으로 전주(36명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2025년							
	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	17	23	15	33	32	44	36	25

2024-2025년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 37주차(2025.9.7.~2025.9.13.) 표본감시 현황은 2025.9.22.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2025년도 37주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 코로나19 입원환자

* 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시:
중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원체 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수

* SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 37주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 17.8명으로 전주(20.2명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주
전체	20.3	22.6	22.0	26.4	21.8	20.6	20.2	17.8
전국 0-6세	27.4	30.3	29.9	35.9	30.2	29.4	29.3	25.8
7-18세	5.4	6.4	5.3	7.1	4.8	4.2	4.3	4.4

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 37주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 37주차(2025.9.7.~2025.9.13.) 표본감시 현황은 2025.9.22.(월) 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시감염병웹보고 및 2025년도 37주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

인천광역시 말라리아 발생 현황

※ 질병관리청 감염병포털에 보고된 자료를 기준으로 작성하였음


말라리아 환자 발생 현황

- (전국) 2025년(1주~38주) 총 542명(38주 신규 20명), 전년 동기간 579명 대비 37명(6.4%) 감소
- (인천) 2025년(1주~38주) 총 100명(38주 신규 5명), 전년 동기간 108명 대비 8명(7.4%) 감소


(단위: 명)

구분		31주	32주	33주	34주	35주	36주	37주	38주
전국	누계	376	399	423	458	482	509	522	542
	주간 신규발생	29	23	24	35	24	27	13	20
인천	누계	66	69	75	81	84	93	95	100
	주간 신규발생	3	3	6	6	3	9	2	5

(전국) 전년 대비 주별 발생 추이




(인천) 전년 대비 주별 발생 추이



지역별 발생 현황(주소지 기준)

- (신고수) 2025년(1주~38주) 강화군 35명(35.0%), 서구 24명(24.0%), 남동구 11명(11.0%), 중구 8명(8.0%), 연수구·부평구 각 7명(7.0%), 미추홀구·계양구 각 3명(3.0%), 옹진군·동구 각 1명(1.0%) 순으로 발생
- (발생률) 2025년(1주~38주) 강화군 50.58명, 옹진군 4.95명, 중구 4.91명, 서구 3.81명, 남동구 2.25명 순

지역별 발생 분포(신고수)



지역별 발생 분포(발생률)



국내 '25-'26절기 인플루엔자 국가예방접종 시작

- 9월 22일 2회 접종 대상 어린이, 9월 29일부터 1회 접종 대상 어린이와 임신부 접종 시작

- 질병관리청은 9월 22일(월)부터 2회 접종 대상 어린이의 인플루엔자 국가 예방접종이 시작되며, 이어 9월 29일(월)부터는 1회 접종 대상 어린이와 임신부 접종이 시작된다고 밝힘
- 2회 접종 대상 어린이는 생후 6개월 ~ 9세 중 인플루엔자 예방접종을 생애 처음으로 받거나, 기존에 1회만 접종 받은 어린이며, 그 외 13세 이하 어린이는 1회 접종함
 - 영유아·초등학생 등 어린이는 단체생활로 인플루엔자 발생·유행에 취약하므로, 올겨울 인플루엔자 유행을 대비하고 인플루엔자로 인한 합병증을 예방하기 위해 예방접종을 받는 것은 매우 중요함
 - 임신부의 경우 인플루엔자 백신 접종으로 인플루엔자 합병증 발생 위험을 줄이고, 태아에게 출생 후 수개월간 유지되는 면역을 전달할 수 있어, 임신 주수와 관계없이 예방접종이 필요함
- 인플루엔자 국가 예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관과 보건소에서 접종할 수 있으며, 예방접종도우미 누리집에서 가까운 위탁의료기관을 확인할 수 있음
 - 접종 대상자는 사전 확인으로 오접종을 예방하고 안전한 접종을 위해 접종 기관 방문 시 신분 확인 서류를 반드시 지참해야 함
 - 접종 후에는 20-30분간 접종 기관에 머물러 이상 반응 여부를 관찰한 후 귀가하며, 어린이의 보호자는 접종 전후 아이 상태를 잘 살피는 것이 중요함
- '25-'26절기 인플루엔자 국가 예방접종은 세계보건기구(WHO)의 권고사항과 예방접종 전문 위원회 심의('24.7월, '25.3월)에 따라 기존 4가 백신에서 3가 백신으로 전환하여 시행됨
 - 3가 백신은 기존 4가 백신에서, 전 세계적으로 장기간 검출되지 않은 B형 Yamagata 바이러스 항원을 제외한 백신으로, 효과성과 안전성 면에서 4가 백신과 차이가 없는 것으로 확인됨

국내· 외 감염병 발생동향

국내 추석 연휴 성묘·벌초 등 야외활동 시 진드기 매개 감염병 예방 수칙 준수 당부

- 9~11월 진드기 매개 감염병(쯔쯔가무시증, SFTS 등) 발생
- 야외 활동 시 진드기에 게 물리지 않도록 긴 옷 착용 및 진드기 기피제 사용 등 예방 수칙 준수
- 야외 활동 후 발열, 구토 등 증상 발생 시 즉시 의료기관 방문하여 진료

- 질병관리청은 가을철 환자가 증가하는 진드기 매개 감염병을 예방하기 위해 추석 연휴 기간 성묘·벌초 및 농작업 등 야외 활동 시 예방 수칙을 준수해 달라고 당부함
 - 국내에서 발생하는 주요 진드기 매개 감염병은 쯔쯔가무시증과 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)이며, 최근 3년간 전체 환자의 74.3%가 가을철(9~11월)에 집중적으로 발생함
- 쯔쯔가무시증 환자는 주로 9~11월에 많이 발생하며 털진드기 유충에 물린 후 10일 이내(잠복기) 고열, 오한 등 증상이 나타나고, 가피(검은 딱지)가 형성됨
 - 털진드기는 평균기온이 20도 이하로 낮아지는 9월 말부터 증가하므로, 추석 연휴 동안 야외 활동 시 각별한 주의가 필요함
- SFTS 환자는 주로 4~11월에 많이 발생하며, 바이러스를 보유한 작은 소피참진드기에게 물린 후 5~14일(잠복기)이 지나 고열, 구토 등 증상이 나타남
 - SFTS는 백신과 치료제가 없고 치명률(18.5%)이 높아 감염되지 않도록 예방수칙을 준수해야 함

[진드기 매개감염병 예방수칙]

농작업 및 야외 활동 전

- 작업복과 일상복 구분하여 입기
- 야외활동 및 농작업 시 진드기에 노출을 최소화할 수 있는 긴팔, 긴바지, 토시,장갑,모자, 목수건, 장화 착용하기
- 작업 시에는 소매를 단단히 여미고 바지는 양말 안으로 집어넣기, 기피제 사용이 도움이 될 수 있음

농작업 및 야외 활동 시

- 풀밭 위에 옷을 벗어두거나 눕지 않으며 풀밭에서 용변 보지 않기 - 돛자리를 펴서 앉고, 사용한 돛자리는 세척하여 햇볕에 말리기
- 등산로를 벗어난 산길 다니지 않기, 진드기가 붙어 있을 수 있는 야생동물과 접촉하지 않기

농작업 및 야외 활동 후

- 입었던 옷을 세탁하고, 샤워나 목욕하기
- 머리카락, 귀 주변, 팔 아래, 허리, 무릎 뒤, 다리 사이 등에 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인하기

※ 출처: 질병관리청 보도자료(2025. 9. 19.)

국내 비브리오패혈증 발생 증가, 고위험군 주의 필요

- 비브리오패혈증 발생이 8월 이후 증가함에 따라 비브리오패혈증 예방수칙 준수 당부
- 간 질환자, 당뇨병 등 기저질환을 가진 고위험군은 각별한 주의 필요

- 질병관리청은 올해 8월 이후 비브리오패혈증 환자 발생이 증가하고 있어 비브리오패혈증 예방을 위해 각별한 주의를 당부함
 - 올해 비브리오패혈증 누적 환자는 19명(사망 8명)으로 치명률은 42.1%로 높으며, 사망한 환자들은 모두 간 질환, 악성종양, 당뇨병 등 기저질환을 가진 비브리오패혈증 고위험군*이 있음
- * 비브리오패혈증 고위험군: 간 질환자, 당뇨병 등 만성질환자, 알코올의존자, 부신피질호르몬제나 항암제 복용 중인 자, 악성종양, 재생불량성 빈혈, 백혈병 환자, 장기이식환자, 면역결핍 환자
- 비브리오패혈증은 매년 해수 온도가 상승하는 8~10월 사이에 환자가 집중적으로 발생하며, 비브리오패혈증균에 오염된 어패류를 생식하거나 상처 난 피부가 오염된 바닷물에 접촉할 때 감염됨
 - 감염 시 급성 발열, 오한, 혈압 저하, 복통, 구토, 설사 등의 증상이 동반되고, 증상 시작 24시간 내에 다리에 발진, 부종, 수포(출혈성) 등의 피부병변이 생김
 - 질병관리청은 비브리오패혈증 예방을 위해서는 어패류, 게, 새우 등 익히지 않은 음식 섭취를 피하는 것이 중요하며, 특히 간 질환, 당뇨병 등 기저질환을 가진 고위험군은 비브리오패혈증 예방수칙을 지킬 것을 당부함

< 비브리오패혈증 예방수칙 >

- 어패류는 충분히 익혀 먹는다. ○ 피부에 상처가 있는 사람은 바닷물에 접촉하지 않는다.
- 어패류 관리 및 조리를 할 때 아래와 같은 사항을 준수한다.

- 어패류는 5도 이하로 저온 보관하고, 조리시에는 85도 이상 가열처리 해야함
- * 어패류는 껍질이 열리고 나서 5분동안 더 끓이고, 증기로 익히는 경우에는 9분 이상 더 요리해야 함
- 어패류를 조리 시 해수를 사용하지 말고 흐르는 수돗물에 깨끗이 씻어야함
- 어패류를 요리한 도마, 칼 등은 반드시 소독 후 사용하고 어패류를 다룰 때 장갑을 착용해야함

 질병관리청

모두의 예방접종이 질병을 이길 병으로

2025-2026절기 인플루엔자 예방접종

대상

어린이
2012. 1. 1. ~ 2025. 8. 31. 출생자

임신부
임신이 확인된 사람

65세 이상
1960. 12. 31. 이전 출생자

일정

어린이	2회 접종 대상자 9. 22.(월) ~ 1회 접종 대상자 9. 29.(월) ~
임신부	9. 29.(월) ~
65세 이상	75세 이상 10. 15.(수) ~ 70 ~ 74세 10. 20.(월) ~ 65 ~ 69세 10. 22.(수) ~

→ 2026년 4월 30일까지 시행

백신

3가 백신 1회 접종
단, 6개월 ~ 9세 미만 어린이 중 과거 접종력이 없거나, 기존에 1회만 접종받은 자는 2회 접종

기관

전국 위탁의료기관 및 보건소
단, 접종 가능 여부는 반드시 예방접종도우미 누리집(nip.kdca.go.kr)에서 사전 확인 필요

이런 분들은 예방접종을 해서는 안 됩니다!

- ☒ 과거 인플루엔자 백신 접종 후 중증(생명에 위협적인) 알레르기 반응이 있었던 경우
- ☒ 인플루엔자 백신 성분에 중증 알레르기 반응이 있었던 경우



이런 분들은 예방접종에 주의해야 합니다!

- ☒ 인플루엔자 예방접종 후 6주 이내 길랭-바레 증후군의 과거력이 있는 사람
- ☒ 중등증 또는 중증 급성질환자는 증상이 호전될 때까지 접종 연기



예방접종 후 이상반응

예방접종 후 발생 가능한 이상반응

☒ 국소 이상반응 : 접종부위가 빨갛게 부어오름, 통증

☒ 전신 이상반응 : 발열, 무력감, 근육통, 두통 등

예방접종 후 이상반응이 생기면

- ☒ 경미한 이상반응은 예방접종 후 나타날 수 있으며, 1~2일 이내 호전됩니다
- ☒ 다만 증상이 심해지거나 장시간 지속되는 경우, 그 밖에 다른 증상이 나타난 경우 의사의 진료를 받도록 합니다

진드기 매개 감염병 예방수칙

1. 작업 및 야외활동 전

- 작업복과 일상복 구분
- 진드기 노출 최소화
(긴팔, 긴바지, 목수건, 토시, 장갑, 양말, 장화)
- 작업 시 소매를 단단히 여미고 바지는 양말 안으로 집어넣기
- 진드기 기피제 사용하기

2. 작업 및 야외활동 시

- 풀밭 위에 옷을 벗어두거나 눕지 않고, 풀밭에서 용변보지 않기
- 돛자리를 펴서 앉고, 사용한 돛자리는 세척하여 햇볕에 말리기
- 등산로를 벗어난 산길 다니지 않기
- 야생동물과 접촉하지 않기

3. 작업 및 야외활동 후

- 입었던 옷을 세탁하고, 목욕하기
- 몸에 진드기가 붙어 있는지 꼼꼼히 확인하기
(특히 어린이, 반려동물)

인천광역시 보건환경연구원

인천의 ⁷³★ 대한민국의 미래

incheon.go.kr/ecopia/

진드기 매개
감염병 예방 안내

안전한 야외활동을 위한 필수 수칙



인천광역시 보건환경연구원

진드기 종류 및 매개 감염병



참진드기

라임병, 진드기매개뇌염
중증열성혈소판감소증후군(SFTS)
(성충: 3-9mm)



털진드기

쯔쯔가무시증
(성충: 1-1.5mm)

농작업 또는 야외활동(등산, 캠핑, 골프 등) 후
발열 등 이상 증상 발생 시 보건소 또는 의료기관
방문하여 진료받기




발열

오한, 근육통

피부발진

소화기증상



진드기에 물렸다면?

1. 보건소 또는 의료기관 방문

진드기가 육안으로 관찰된다면 손으로 터트리거나
떼지 말고 보건소 또는 의료기관을 방문하여 진드기 제거



2. 의료기관 방문이 어렵다면



핀셋을 사용해 피부표면에
최대한 가깝게 진드기
머리 부분 잡기



직각으로
천천히 제거



물린 부위
소독

3. 진드기 교상 부위 및 장소 (24년 기준 / 출처 질병관리청)


① 다리·발 40.0%, 등 12.3%, 팔·손 10.8%, 복부 10.8%,
얼굴(귀, 목 포함) 6.2%, 그 외 19.9%

② 주로 발 작업(논, 밭)에 종사하거나 야외활동
(성묘, 골프, 등산, 캠핑, 제조작업 등) 중에 물리는 경우 많음



[반려동물 교상 부위]

[사람 교상 부위]



2023. 7. 25. 


증상 발생 시 어떻게 해야 하나요?

즉각적인 치료가 중요하므로
의료진의 판단에 따른 ①적절한 항생제 치료 및
②적극적인 상처치료(병변 절제 등)가 필요합니다.

치사율이 약 50%내외로 알려져있으며,
특히, 간 질환자(만성 간염, 간경화, 간암 등), 만성질환자(당뇨병 등),
면역저하자 등은 조기진단과 신속한 치료를 해야합니다.



5/7

2023. 7. 25. 

비브리오패혈증은 어떻게 예방할 수 있나요?

간 질환자(만성 간염, 간경화, 간암 등), 알코올 중독자, 면역저하자 등은
고위험군으로 특별히 더 주의가 필요합니다.

★특히 주의★



어패류는 흐르는 물에 씻고
85℃ 이상에서 완전히 익혀먹기
(특히 고위험군은 어패류 생식 피하기)

★특히 주의★



피부에 상처가 있는 사람은
바닷물과 접촉 금지



바닷물 접촉 후,
물과 비누로 노출 부위 씻기



바닷물 어패류는 가급적
5℃이하에서 저온 저장



어패류를 취급할 경우 장갑 착용,
요리한 도마, 칼 등은 소독 후 사용

6/7

2023. 7. 25. 

비브리오패혈증 예방수칙 준수로 건강한 여름 보내세요!



7/7

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

