

# ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기

발행일 2023. 11. 1.(수) 통권 제214호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층


전 화 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 코로나19 양성자 감시 현황
- 05 국내·외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료


## 01 주간 감염병 소식

### 전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황

#### 전국




#### 인천광역시



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 31,728건, 수두 20,164건, 유행성이하선염 6,803건, C형간염 6,073건, 쯔쯔가무시증 1,486건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,487건, 수두 924건, C형간염 514건, 유행성이하선염 345건, 말라리아 123건 순으로 신고됨
- 신고현황은 2023. 11. 1.(수) 질병관리청 질병보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며 '23년 누적기간(1. 1.~10. 28.)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

### 인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 43주차 인천광역시 감염병은 총 94건 신고되었으며, 최근 3주(40~42주) 평균(110건) 대비 16건 감소
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 55건, 수두 11건, C형간염 10건, 유행성이하선염 10건, 말라리아 2건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

| 구 분 |              | 인천   |     |     |     |               |       |       |       | 전국            |        |         |        |
|-----|--------------|------|-----|-----|-----|---------------|-------|-------|-------|---------------|--------|---------|--------|
|     |              | 2023 |     |     |     | 동기간대비 (1-43주) |       |       |       | 동기간대비 (1-43주) |        |         |        |
|     |              | 43주  | 42주 | 41주 | 40주 | 2023          | 2022  | 증감    | 5년 평균 | 2023          | 2022   | 증감      | 5년 평균  |
| 1급  | 보툴리눔독소증      |      |     |     |     |               |       |       |       | 1             |        | ▲ 1     | 1      |
| 2급  | 수두           | 11   | 26  | 20  | 24  | 924           | 701   | ▲ 223 | 1,397 | 20,164        | 14,416 | ▲ 5,748 | 28,746 |
|     | 홍역           |      |     |     |     |               |       |       | 2     | 5             |        | ▲ 5     | 40     |
|     | 콜레라          |      |     |     |     |               |       |       |       |               |        |         |        |
|     | 장티푸스         |      |     |     |     |               | 3     | ▼ 3   | 3     | 20            | 36     | ▼ 16    | 46     |
|     | 파라티푸스        |      |     |     |     | 2             | 5     | ▼ 3   | 2     | 32            | 31     | ▲ 1     | 39     |
|     | 세균성이질        |      |     |     |     | 1             | 3     | ▼ 2   | 3     | 28            | 31     | ▼ 3     | 42     |
|     | 장출혈성대장균감염증   |      |     |     |     | 5             | 11    | ▼ 6   | 8     | 195           | 193    | ▲ 2     | 186    |
|     | A형간염         |      | 1   |     |     | 47            | 111   | ▼ 64  | 387   | 1,099         | 1,687  | ▼ 588   | 5,693  |
|     | 백일해          |      |     |     |     | 1             | 2     | ▼ 1   | 5     | 69            | 26     | ▲ 43    | 122    |
|     | 유행성이하선염      | 10   | 1   | 5   | 8   | 372           | 279   | ▲ 93  | 423   | 6,803         | 5,183  | ▲ 1,620 | 8,369  |
|     | 풍진           |      |     |     |     |               |       |       | 0     |               |        |         | 2      |
|     | 수막구균 감염증     |      |     |     |     |               |       |       | 0     | 8             | 1      | ▲ 7     | 6      |
|     | b형헤모필루스인플루엔자 |      |     |     |     |               |       |       |       | 1             | 1      | - 0     | 1      |
|     | 폐렴구균 감염증     |      | 1   |     |     | 34            | 23    | ▲ 11  | 24    | 333           | 288    | ▲ 45    | 311    |
|     | 한센병          |      |     |     |     |               |       |       | 0     | 1             | 1      | - 0     | 3      |
|     | 성홍열          | 2    |     |     | 1   | 23            | 16    | ▲ 7   | 102   | 562           | 416    | ▲ 146   | 2,038  |
|     | VRSA 감염증     |      |     |     |     |               |       |       |       |               | 1      | ▼ 1     | 2      |
|     | CRE 감염증      | 55   | 62  | 64  | 68  | 2,487         | 2,261 | ▲ 226 | 1,669 | 31,728        | 24,746 | ▲ 6,982 | 20,643 |
|     | E형간염         | 1    |     | 1   |     | 27            | 17    | ▲ 10  | 16    | 450           | 432    | ▲ 18    | 350    |
| 3급  | 파상풍          |      |     |     |     | 2             |       | ▲ 2   | 0     | 23            | 20     | ▲ 3     | 23     |
|     | B형간염         |      |     |     |     | 11            | 19    | ▼ 8   | 17    | 265           | 291    | ▼ 26    | 310    |
|     | 일본뇌염         |      |     |     |     |               |       |       | 0     | 13            | 5      | ▲ 8     | 15     |
|     | C형간염         | 10   | 13  | 4   | 12  | 514           | 546   | ▼ 32  | 613   | 6,073         | 6,933  | ▼ 860   | 7,921  |
|     | 말라리아         | 2    | 2   | 4   | 8   | 123           | 61    | ▲ 62  | 73    | 730           | 394    | ▲ 336   | 464    |
|     | 레지오넬라증       | 1    |     | 1   |     | 17            | 30    | ▼ 13  | 24    | 416           | 347    | ▲ 69    | 364    |
|     | 비브리오패혈증      |      |     | 2   |     | 7             | 3     | ▲ 4   | 4     | 68            | 43     | ▲ 25    | 52     |
|     | 발진열          |      |     |     | 1   | 2             | 11    | ▼ 9   | 3     | 18            | 18     | - 0     | 10     |
|     | 쯔쯔가무시증       | 2    | 1   | 1   |     | 10            | 15    | ▼ 5   | 13    | 1,486         | 1,615  | ▼ 129   | 1,341  |
|     | 렙토스피라증       |      |     |     |     | 1             |       | ▲ 1   | 2     | 38            | 67     | ▼ 29    | 74     |
|     | 브루셀라증        |      |     |     |     | 1             |       | ▲ 1   | 0     | 4             | 6      | ▼ 2     | 4      |
|     | 신증후군출혈열      |      |     |     |     | 3             | 2     | ▲ 1   | 3     | 279           | 149    | ▲ 130   | 207    |
|     | CJD/vCJD     |      |     |     |     | 2             | 1     | ▲ 1   | 2     | 42            | 47     | ▼ 5     | 48     |
|     | 뎅기열          |      | 1   |     |     | 11            | 5     | ▲ 6   | 7     | 149           | 64     | ▲ 85    | 98     |
|     | 큐열           |      |     |     |     | 3             | 1     | ▲ 2   | 2     | 48            | 95     | ▼ 47    | 78     |
|     | 라임병          |      |     |     |     | 6             |       | ▲ 6   | 2     | 30            | 12     | ▲ 18    | 18     |
|     | 유비저          |      |     |     |     |               |       |       | 0     | 2             |        | ▲ 2     | 2      |
|     | 치쿤구니아열       |      |     |     |     |               |       |       | 0     | 10            | 5      | ▲ 5     | 6      |
|     | 중증열성혈소판감소증후군 |      |     |     |     |               | 4     | ▼ 4   | 2     | 191           | 187    | ▲ 4     | 199    |
|     | 지카바이러스감염증    |      |     |     |     |               |       |       | 0     | 2             | 1      | ▲ 1     | 1      |

- 43주차(2023. 10. 22. - 2023. 10. 28.) 전수감시 신고 현황은 2023. 11. 1.(수) 질병관리청 질병 보건통합관리시스템에 보고된 자료를 기준으로 작성하였으며, 2023년 자료는 변동 가능한 잠정통계임
- 5년 평균은 최근 5년(2019-2023)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임
- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병환자, 감염병 의사환자, 병원체보유자가 포함될 수 있음
- 지역별 통계는 환자주소지 기준으로 집계함(단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)
- 최근 5년간(2019-2023) 동안 발생이 없었던 에볼라 바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기중후군,중동호흡기중후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트나일열, 진드기매개뇌염은 제외

# 인천광역시 감염병 표본감시 신고 현황

## 인플루엔자 표본감시 현황


### 주별 인플루엔자 의사환자(ILI) 현황(2023-2024절기)

- (전국) 42주차 인플루엔자 의사환자 비율은 외래환자 1,000명당 18.8명으로 전주(15.5명) 대비 증가
- (인천) 42주차 인플루엔자 의사환자 비율은 외래환자 1,000명당 24.2명으로 전주(19.8명) 대비 증가
- ※ 2023-2024절기 유행기준은 외래환자 1,000명당 6.5명


단위: 인플루엔자 의사환자 수/진료환자 1,000명

| 구분 | 2023년 |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | 35주   | 36주  | 37주  | 38주  | 39주  | 40주  | 41주  | 42주  |
| 전국 | 10.0  | 11.3 | 13.1 | 17.3 | 20.8 | 14.6 | 15.5 | 18.8 |
| 인천 | 14.7  | 16.7 | 17.6 | 28.1 | 44.5 | 24.8 | 19.8 | 24.2 |

#### 최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 비율(전국)




#### 최근 5절기 주별 인플루엔자 의사환자 비율(인천)




1) 인플루엔자 의사환자 비율(전분율) =  
(인플루엔자 의사환자 수 / 총 진료환자 수) x 1,000

#### 2023-2024절기 연령별 인플루엔자 의사환자 비율(전국)



#### 2023-2024절기 연령별 인플루엔자 의사환자 비율(인천)




## 바이러스성 급성호흡기감염증 표본감시 현황


- 42주차(2023.10.15~2023.10.21.) 표본감시 현황은 2023.10.30.(월) 질병관리청 질병보건통합관리시스템 표본감시감염병웹보고 및 2023년도 42주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 인플루엔자 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 인플루엔자 의사환자\* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함  
\* 의사환자: 38℃ 이상의 갑작스러운 발열과 더불어 기침 또는 인후통을 보이는 자
- 급성호흡기감염증 표본감시 현황은 표본감시 참여기관에 입원한 환자 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 196개 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원) / 전국 220개 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상)  
\* 인천광역시 인플루엔자 표본감시사업 참여의료기관(의원): 11개  
\* 인천광역시 급성호흡기감염증 표본감시사업 참여의료기관(병원급 이상): 13개

- (인천) 42주차 바이러스성 급성호흡기감염증 입원환자는 52명으로 전주(54명) 대비 감소
- (인천) 42주차 인플루엔자 입원환자는 12명으로 전주(5명) 대비 증가

#### 2023년 42주차 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자 입원환자 현황



#### 최근 3년 바이러스성 급성호흡기감염증(7종) 및 인플루엔자 입원환자 현황



# 인천광역시 코로나19 양성자 감시 현황


## 코로나19 양성자 감시 현황

### 주간 코로나19 양성자 발생 추이


- (전국) 43주차 코로나19 신규 양성자는 8,635명으로 전주(7,387명) 대비 증가
- (인천) 43주차 코로나19 신규 양성자는 694명으로 전주(598명) 대비 증가

| 구분 |             | 40주   | 41주   | 42주   | 43주   |
|----|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 전국 | 신규 양성자 수(명) | 8,634 | 7,537 | 7,387 | 8,635 |
|    | 일평균(명)      | 1,233 | 1,077 | 1,055 | 1,234 |
| 인천 | 신규 양성자 수(명) | 756   | 595   | 598   | 694   |
|    | 일평균(명)      | 108   | 85    | 85    | 99    |

#### 최근 4주간 코로나19 양성자 발생 현황(전국)



#### 최근 4주간 코로나19 양성자 발생 현황(인천)




### 주간 코로나19 60세 이상 양성자 수


- (전국) 43주차 코로나19 60세 이상 신규 양성자는 3,300명 으로 전주(2,902명) 대비 증가
- (인천) 43주차 코로나19 60세 이상 신규 양성자는 237명으로 전주(221명) 대비 증가

| 구분 |                 | 40주   | 41주   | 42주   | 43주   |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| 전국 | 60세 이상 양성자 수(명) | 3,228 | 2,901 | 2,902 | 3,300 |
|    | 60세 이상 비중(%)    | 37.4  | 38.5  | 39.3  | 38.6  |
| 인천 | 60세 이상 양성자 수(명) | 254   | 211   | 221   | 237   |
|    | 60세 이상 비중(%)    | 33.6  | 35.5  | 37.0  | 34.1  |

#### 최근 4주간 코로나19 60세 이상 양성자 발생 현황(전국)



#### 최근 4주간 코로나19 60세 이상 양성자 발생 현황(인천)



- 43주차(2023.10.22~2023.10.28.) 코로나19 양성자 감시 현황은 2023.11.1.(수) 질병관리청 코로나19 정보관리시스템 및 2023년 10월 4주차 코로나19 양성자(표본) 감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 코로나19 검사 양성자 감시 결과는 감시기관에서 신고된 자료를 진단일 기준으로 집계한 잠정통계로 신고된 시점에 따라 변동될 수 있음

- 코로나19 양성자(표본) 감시체계: 기존 전수감시 체계에서 일부 감시기관(527개소) 내 양성자 신고 체계로 변경, 기존 표본감시로는 파악하기 어려운 지역·연령별 발생경향을 파악하고 변이바이러스 유행양상 모니터링이 가능한 감시체계

- 감시기관: 코로나19 치료제 처방이 가능한 의료기관(임상감시), 임상감시 기간 중 참여 의사를 밝힌 의료기관(병원체 감시)

\* 전국 코로나19 양성자 임상 감시기관: 약 527개소


\* 인천 코로나19 양성자 임상 감시기관: 약 30개소

## [국내] 가을바람과 함께 돌아온 털진드기(쯔쯔가무시증)

- 전국적 조사에서 쯔쯔가무시균(*Orientia tsutsugamushi*) 매개체인 털진드기 트랩지수가 평년 동 기간 대비 2배 이상 증가
- 털진드기에 물리지 않도록 예방수칙 준수 권고상

- 10월 27일(42주차) 현재 쯔쯔가무시증(Scrub Typhus) 주요 매개체인 털진드기의 트랩지수는 0.91로 평년 동 기간 대비 2배 이상 증가하여 야외 활동 시 털진드기 물림 주의가 필요함.
- 털진드기 발생밀도 감시사업은 8월 넷째 주부터 12월 셋째 주까지 전국 20개 지역에서 수행하고 있음.
- 국내에 쯔쯔가무시균을 매개하는 털진드기는 총 8종\*으로 알려져 있으며 2022년도 감시 결과 주로 남부와 일부 북부에서는 활순털진드기가, 중부 및 서부 지역에서는 대잎털진드기가 대표적으로 많은 것으로 확인되었음.  
\* 활순털진드기(*Leptotrombidium scutellare*), 대잎털진드기(*L. pallidum*), 수염털진드기(*L. palpalis*), 동양털진드기(*L. orientale*), 반도털진드기(*L. zetzum*), 사육털진드기(*Neotrombicula japonica*), 조선방망이털진드기(*Euschoengastia koreaensis*), 들평털진드기(*Helenicula miyagawai*)
- 털진드기가 40주부터 42주차(9월말~10월초)에 증가하기 시작하며 환자는 43주부터 시작하여 47주차(10월말)까지 큰폭으로 증가하는 것으로 나타났음.
- 쯔쯔가무시균 감염 초기에는 항생제 치료로 완치가 가능하기에 조기 발견 및 치료가 중요하며 야외활동 후 진드기에 물린 자국(가피)이 관찰되거나 10일 이내 발열·발진 등 증상이 나타나면 쯔쯔가무시증을 의심하고 의료기관을 방문하여 치료를 받아야 함.

털진드기 트랩지수와 쯔쯔가무시증 환자수(2021년~2023년)



※ 출처: 질병관리청 보도자료

## [국외] Dengue/유럽, 미국 - 비풍토지역에서 지역사회 감염사례 보고

## ○ (이탈리아) 3년 만에 지역사회 유행 및 확진 사례 66건 발생

- 이탈리아에서 지난 8월 중순 지역사회 내 감염이 추정되는 Dengue 사례가 3년 만에 발생한 이후 현재까지 산발적으로 Dengue 발생이 보고되고 있음.
- 8월 18일 롬바르디아에서 지역사회 내 발생으로 추정되는 첫 사례가 발생한 이후 10월 24일까지 총 2개 주에서 66건의 확진 사례가 보고됨.
- 이탈리아는 Dengue 풍토병 지역은 아니며 2010년 이후에는 2020년을 제외하고는 지역사회 내 발생 사례는 보고되지 않았음.  
\* 2020년 지역사회 발생 사례 11건 보고됨.

## ○ (프랑스) 파리 근교에서 첫 지역사회 Dengue 발생

- 프랑스의 일드 프랑스(Ile-de-France) 지역 보건부는 주에서 처음으로 지역사회 감염이 추정되는 Dengue 확진 사례가 발생하였다고 발표함.
- 파리가 위치한 일드 프랑스 지역에서는 지금까지 지역사회 내에서 Dengue가 발생한 사례가 없었으며 이번이 첫 번째 사례로 추정됨.
- 일드 프랑스 지역에는 Dengue의 매개모기인 흰줄숲모기(Aedes albopictus)가 서식하고 있어 지역 보건부는 지속해서 모기퇴치 캠페인을 수행 중임.

## ○ (미국) 캘리포니아주에서 첫 지역사회 Dengue 발생

- 미국 캘리포니아(California)주의 패서디나 지역 공중보건국은 여행과 관련이 없는 첫 번째 Dengue 확진 사례 발생을 발표함. 확진자의 해외 여행력 및 발생지역 방문 이력이 확인되지 않아 지역사회 내 발생으로 추정됨.
- 캘리포니아주에서 지역사회 감염으로 추정되는 확진 사례는 역대 첫 번째이며 최근 미국 본토에서는 플로리다에서만 산발적으로 지역사회 내 감염이 보고 중임.
- 패서디나 지역 공중보건국은 미국 본토에서의 Dengue 발생은 드물어서 지역사회의 주민들이 감염에 노출될 위험은 매우 낮다고 평가하였으며 표준적인 예방조치를 안내함.

※ 출처: 질병관리청 주간 해외감염병 발생동향 제42호



### 진드기 매개 감염병이란?

- 세균이나 바이러스에 감염된 진드기에 물려 발생하는 감염병을 말함
  - 대표적으로 쯔쯔가무시증, 중증열성혈소판감소증후군(SFTS), 라임병 등이 있음
  - 가을철(9~11월)에 가장 많이 발생하며, 야외활동\* 시 진드기에 물려 감염될 수 있음
- \* 농축산 관련 작업, 주말농장, 등산, 캠핑, 성묘, 낚시 등

증상



### | 진드기 매개 감염병 특성 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>쯔쯔가무시증</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요특징 : [진드기 물린 자국] → 검은 딱지(가피)</li> <li>• 임상증상 : 발열, 근육통, 오한, 발진, 두통 등</li> <li>• 발생시기 : 1~12월(10~11월에 집중발생)</li> <li>• 잠복기 : 10일 이내</li> <li>• 치명률 : 0.1~0.3%</li> </ul>                             |  |
| <b>중증열성<br/>혈소판감소<br/>증후군(SFTS)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요특징 : [진드기 물린 부위에] → 붉은 반점<br/>* 백신과 치료제 없음</li> <li>• 임상증상 : 38℃ 이상 고열, 구토, 설사, 두통, 근육통 등</li> <li>• 발생시기 : 4~11월</li> <li>• 잠복기 : 5~14일</li> <li>• 치명률 : 약 20%(2013~2022년 평균 치명률 18.7%)</li> </ul> |  |
| <b>라임병</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요특징 : [진드기 물린 부위에] → 과녁모양 붉은 반점</li> <li>• 임상증상 : 발열, 오한, 피로감, 두통, 관절통 등</li> <li>• 발생시기 : 여름철</li> <li>• 잠복기 : 3~30일</li> <li>• 치명률 : 0.1% 미만</li> </ul>                                            |  |

※ 출처: 질병관리청

# 진드기 매개 감염병! 최선의 예방책은 진드기에 물리지 않는 것입니다

아외활동 전  
**옷 제대로 입고**

1

밝은 색 긴 팔,  
긴 바지, 모자,  
양말, 신발 등 착용



아외활동 전, 중  
**기피제 뿌리고**

2

사용하는 기피제의  
지속시간 확인하여  
자주 뿌려주기



아외활동 중  
**돛자리 사용하고**

3

풀밭에  
옷 벗어놓지  
않기



아외활동 후  
**옷 털고,  
세탁하고**

4

옷은 털어서  
세탁하기



아외활동 후  
**씻으며, 물린 흔적  
찾아보고**

5

빨레 물린 상처  
또는 진드기  
확인하기



아외활동 후  
**빨리 병원가서  
치료받고**

6

열이 나거나  
아프면  
바로 병원 가기





※ 출처: 질병관리청

# 뎡기열 안내문



## 뎡기열이란?

- ▶ 뎡기바이러스에 감염된 숲모기에 물려 감염되며, 현재 예방백신 및 치료제는 없습니다.
- ▶ 전 세계 100여 개국에서 매년 1억명 이상 뎡기열에 감염되며, 국내에도 매년 해외 유입으로 지속 발생 중입니다.
- ▶ 뎡기열은 이집트숲모기와 흰줄숲모기에 의해 매개되며, 이 중 흰줄숲모기는 국내에 서식하고 있지만 뎡기바이러스는 검출되지 않았습니다.



〈이집트숲모기〉 열대·아열대 지역 도시에서 주로 서식  
(사진출처 : 세계보건기구)



〈흰줄숲모기〉 북미, 유럽, 아시아 산림지역에서 주로 서식

## 뎡기열 증상은?

- ▶ 모기에 물린 후 5~7일 잠복기 후 갑작스런 고열, 두통, 발진, 근육통 등 증상이 나타납니다. 발진은 몸통, 손, 팔, 다리, 발 등에 나타납니다.
- ▶ 뎡기열 환자 중 약 5%는 중증 뎡기 감염증(뎡기쇼크나 뎡기출혈열 등)으로 진행되므로 사망위험을 줄이기 위해 빠른 진단 및 치료가 필요합니다.

## 뎡기열 예방수칙 4가지


|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>①</p>  <p><b>여행전 국가별 감염병 예방수칙을 확인</b><br/>* 질병관리청 홈페이지에서 확인 가능<br/>(감염병-해외감염정보-해외감염병NOW)</p> | <p>②</p>  <p><b>여행 중 모기예방물품 준비하여 활용</b><br/>모기퇴치를 위한 예방물품(기피제, 모기장, 밝은색 긴팔 및 긴바지 등)을 준비하여 사용</p> | <p>③</p>  <p><b>재감염이 되지 않도록 조심하기</b><br/>첫번째 감염과 다른 뎡기바이러스에 재감염되는 경우 중증뎡기감염증으로 진행될 수 있어 주의 필요</p> | <p>④</p>  <p><b>귀국후 2주 이내 의심증상 발생시, 의료기관 방문하고 치료받기</b><br/>의심증상 : 발열, 발진, 심한두통, 안외통증, 근육통, 관절통 등</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

# MEMO

# ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



인천광역시 감염병관리지원단  
Incheon Communicable Diseases Center