

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지



홈페이지 바로가기


발행일 2025. 9. 18.(목) 통권 제309호

발행처 인천광역시 감염병관리지원단

주 소 인천광역시 남동구 정각로 29 인천광역시청 2층

연락처 032-440-8031

- 01 주간 감염병 소식
- 02 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황
- 03 감염병 표본감시 신고 현황
- 04 인천광역시 말라리아 발생 현황
- 05 국내외 감염병 발생동향
- 06 홍보자료



01


주간 감염병 소식

전국 및 인천광역시 감염병 누적 신고 현황



- (전국) 전국 감염병은 CRE 감염증 34,674건, 수두 21,916건, 성홍열 9,549건, 백일해 5,497건, 유행성 이하선염 5,066건 순으로 신고됨
- (인천) 인천광역시 감염병은 CRE 감염증 2,826건, 성홍열 972건, 수두 882건, C형간염 344건, 유행성 이하선염 285건 순으로 신고됨
- 신고현황은 '25. 9. 17.(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며 '25년 누적기간(1주차~37주차)에 신고된 다빈도 5개 감염병에 대한 누적신고 건수임

인천광역시 다빈도 감염병 주요 신고 현황



- 37주차 인천광역시 감염병은 총 170건 신고되었으며, 최근 3주(2025년 34주~2025년 36주) 평균(166건) 대비 4건 증가함
- 신고수 상위 5개 감염병은 CRE 감염증 113건, 성홍열 11건, C형간염 10건, 수두 7건, 매독 4건 순서임
- 소식지 내 인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황(2페이지)을 참조

인천광역시 감염병 전수감시 신고 현황

구 분		인천								전국			
		2025				동기간대비 (1-37주)				동기간대비 (1-37주)			
		37주	36주	35주	34주	2025	2024	증감	5년 평균	2025	2024	증감	5년 평균
1급	보툴리눔독소증												0
2급	수두	7	14	34	13	882	850	▲ 32	798	21,916	21,955	▼ 39	17,932
	홍역					2	2	- 0	1	68	47	▲ 21	24
	장티푸스					1	2	▼ 1	1	23	23	- 0	27
	파라티푸스						1	▼ 1	1	13	11	▲ 2	17
	세균성이질					2	3	▼ 1	2	49	31	▲ 18	29
	장출혈성대장균감염증			2	1	26	10	▲ 16	11	371	197	▲ 174	207
	A형간염				2	45	48	▼ 3	136	807	870	▼ 63	1,815
	백일해	1		1		266	2,747	▼ 2,481	603	5,497	21,755	▼ 16,258	5,464
	유행성이하선염	1	7	8	4	285	258	▲ 27	287	5,066	4,915	▲ 151	5,360
	수막구균 감염증									8	16	▼ 8	7
	b형헤모필루스인플루엔자									1	1	- 0	1
	폐렴구균 감염증					21	26	▼ 5	23	323	341	▼ 18	277
	한센병									2	3	▼ 1	2
	성홍열	11	12	19	9	972	391	▲ 581	285	9,549	4,339	▲ 5,210	3,051
	VRSA 감염증					1		▲ 1	0	2	1	▲ 1	1
	CRE 감염증	113	113	93	110	2,826	2,594	▲ 232	2,170	34,674	30,238	▲ 4,436	25,827
	E형간염		1		1	20	33	▼ 13	20	597	527	▲ 70	441
3급	파상풍					2	4	▼ 2	2	17	19	▼ 2	17
	B형간염					11	16	▼ 5	15	180	177	▲ 3	232
	일본뇌염										7	▼ 7	3
	C형간염	10	12	2	9	344	394	▼ 50	446	4,095	4,754	▼ 659	5,592
	말라리아	2	9	4	6	96	101	▼ 5	75	521	556	▼ 35	454
	레지오넬라증				2	18	26	▼ 8	22	381	319	▲ 62	317
	비브리오패혈증					1	2	▼ 1	2	30	26	▲ 4	30
	발진열					2	6	▼ 4	2	9	28	▼ 19	10
	쯔쯔가무시증					1	3	▼ 2	5	224	1,004	▼ 780	719
	렙토스피라증								1	29	32	▼ 3	43
	브루셀라증								0	5	5	- 0	5
	신증후군출혈열					3	2	▲ 1	2	119	189	▼ 70	161
	CJD/vCJD					3	6	▼ 3	3	42	44	▼ 2	45
	당기열				3	9	11	▼ 2	6	76	150	▼ 74	79
	큐열					1	1	- 0	1	49	45	▲ 4	43
	라임병						1	▼ 1	2	23	23	- 0	18
	유비저									4	1	▲ 3	2
	치쿤구니아열									3	4	▼ 1	5
	중증열성혈소판감소증후군					1	2	▼ 1	1	175	100	▲ 75	124
	지카바이러스감염증									3		▲ 3	1
	옴폭스									14	13	▲ 1	14
	매독	4	3	3	1	125	113	▲ 12	119	1,622	1,992	▼ 370	1,807
	매독(선천성)					1		▲ 1	1	10	9	▲ 1	10

- 37주차(2025. 9. 7. ~ 2025. 9. 13.) 전수감시 신고 현황은 2025. 9. 17(수) 질병관리청 감염병포털 감염병통계 자료를 참고하여 작성하였으며, 2025년 통계자료는 변동 가능한 잠정통계임

- 5년 평균은 최근 5년(2021-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균이며 옴폭스, 매독, 매독(선천성)은 최근 2년(2024-2025)의 1주부터 해당 주까지 누적 신고수의 평균임

- 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 근거하여 국가 감염병 감시체계를 통해 보고된 감염병 환자 발생 신고를 기초로 집계되며, 감염병별 신고범위에 따라 감염병 환자, 감염병 의사환자, 병원체 보유자가 포함될 수 있음

- 지역별 통계는 환자 주소지 기준으로 집계함 (단, VRSA 감염증과 CRE 감염증은 신고한 의료기관 주소지 기준임)

- 최근 5년(2021-2025)동안 발생이 없었던 에볼라바이러스병, 마버그열, 라싸열, 크리미안콩고출혈열, 남아메리카출혈열, 리프트밸리열, 두창, 페스트, 탄저, 아토병, 중증급성호흡기증후군, 중증호흡기증후군, 동물인플루엔자 인체감염증, 신종인플루엔자, 디프테리아, 콜레라, 풍진, 폴리오, 발진티푸스, 공수병, 황열, 웨스트니일열, 진드기매개뇌염은 제외함

감염병 표본감시
신고 현황

코로나19 입원환자 표본감시 현황


급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 36주차 병원급 의료기관(221개소) 코로나19 입원환자는 433명으로 전주(406명) 대비 증가

(단위: 명)

구분	2025년							
	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주
급성호흡기감염증 (ARI) 코로나19 입원환자 수	123	139	220	272	302	367	406	433

2024-2025년 주별 급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)




중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시

- (전국) 36주차 상급종합병원급 의료기관(42개소) 코로나19 입원환자는 34명으로 전주(44명) 대비 감소

(단위: 명)

구분	2025년							
	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주
중증급성호흡기감염증 (SARI) 코로나19 입원환자 수	10	17	23	15	33	32	44	34

2024-2025년 주별 중증급성호흡기감염증 코로나19 바이러스 입원환자 발생 현황(전국)



- 36주차(2025.8.31.~2025.9.6.) 표본감시 현황은 2025.9.15.(월) 질병관리청 감염병포털 코로나19 주간 발생현황 및 2025년도 36주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음
- 코로나19 입원환자 표본감시 현황은 급성호흡기감염증(중증급성호흡기감염증)으로 표본감시 참여기관에 입원한 환자의 검사 결과를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함
- * 급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 급성호흡기감염증(ARI, Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 병원급 이상 의료기관 221개소에서 신고한 코로나19 입원환자
- * 중증급성호흡기감염증 코로나19 입원환자 감시: 중증급성호흡기감염증(SARI, Severe Acute Respiratory Infection) 표본감시에 참여하는 종합병원급 이상 의료기관 42개소에서 신고한 SARI 환자 중 병원에 검사 결과 상 코로나19 양성으로 확인된 입원환자 수
- * SARI 환자 정의: 38℃ 이상의 고열 및 기침을 동반하고 입원을 필요로 하며, 10일 이내에 증상을 보인 자

감염병 표본감시
신고 현황

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 36주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 20.5명으로 전주(20.6명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주	36주
전체	12.6	20.3	22.6	22.0	26.4	21.8	20.6	20.5
전국 0-6세	17.5	27.4	30.3	29.9	35.9	30.2	29.4	29.6
7-18세	2.3	5.4	6.4	5.3	7.1	4.8	4.2	4.4

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 36주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 36주차(2025.8.31~2025.9.6.) 표본감시 현황은 2025.9.15.(월) 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시감염병웹보고 및 2025년도 36주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

수족구병 표본감시 현황


주별 연령별 수족구병 의사환자 임상감시 현황

- (전국) 35주차 수족구병 의사환자 분율은 외래환자 1,000명당 20.8명으로 전주(21.0명) 대비 감소

단위: 수족구병 의사환자 수/진료환자 1,000명

구분	2025년							
	28주	29주	30주	31주	32주	33주	34주	35주
전체	12.8	12.6	20.3	22.6	22.0	26.4	21.0	20.8
전국 0-6세	18.1	17.5	27.4	30.3	29.9	35.9	29.0	29.8
7-18세	2.2	2.3	5.4	6.4	5.3	7.1	4.8	4.3

2021-2025년 주별 수족구병 의사환자 분율(전국)




1) 수족구병 의사환자 분율(전분율) =
(수족구병 의사환자 수/총 진료환자 수) x 1,000

2025년 35주차 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



최근 1년 연령별 수족구병 의사환자 분율(전국)



- 35주차(2025.8.24~2025.8.30.) 표본감시 현황은 2025.9.8.(월) 질병관리청 방역통합정보시스템 표본감시감염병웹보고 및 2025년도 35주차 표본감시 주간소식지 자료를 참고하여 작성하였음

- 수족구병 표본감시 현황은 표본감시 참여기관의 수족구병 의사환자* 감시 자료를 보고 시점 기준으로 분석한 잠정통계로 변동 가능함

* 의사환자: 감염병의 병원체가 인체에 침입한 것으로 의심이 되나 감염병환자로 확인되기 전 단계에 있는 사람

- 수행기관: 질병관리청 감염병정책국 감염병관리과 / 전국 110개 수족구병 표본감시사업 참여의료기관(의원)

국내·외 감염병 발생동향

국외 에볼라바이러스병

- (콩고민주공화국) 25년 9월 콩고민주공화국에서 에볼라바이러스병 유행 발생


- '25년 9월 1일 아프리카 콩고민주공화국 보건부는 카사이(Kasai) 주 불라페(Bulape) 지역에서 에볼라 바이러스병 의심 환자가 발생하여 WHO에 보고함. 의심환자 5명 및 추정사망 1명에서 채취한 검체 검사 결과 에볼라바이러스 중 자이레주(Zaire strain)에 감염된 것으로 확인됨(9.3.).
 - 첫 의심환자는 임신 34주 차의 임신부로 혈변, 출혈, 구토, 무력증, 다발성 장기 부전 등의 증상을 보이며 입원 후 사망하였으며, 환자와 접촉했던 의료진 2명도 유사한 증상으로 사망함.
- 최근(9.6. 기준) 카사이 주 불라페 지역 3곳(Bulape, Bulape Com, Dikolo) 및 음웨카(Mweka) 지역에서 에볼라바이러스병 의심환자 32명(확진 5명, 사망 15명) 보고, 사망자 중 4명은 의료진으로 밝혀짐.
- 콩고민주공화국 보건부는 에볼라바이러스병 유행을 선언하고 의심환자들을 격리하여 치료하고 있으며, 접촉자 추적 및 격리, 위험 소통 및 적극적인 감시활동을 시행 중임. WHO는 DR콩고 보건당국에 어베보(Ervebo) 백신 2,000회분을 유행 지역으로 조달하여 의료종사자와 접촉자에게 접종할 예정임.
- 이번 에볼라바이러스병 유행이 발생한 지역이 앙골라 국경과 인접한 곳으로 국가 간 전파 가능성 차단을 위해 국경을 포함한 감시 및 대응 활동 강화가 중요함. 전파경로에 대한 역학조사는 현재 진행 중이며, 발생 원인은 확인되지 않아 지역사회로의 추가 감염 가능성이 존재함. WHO는 이번 에볼라바이러스병 발생으로 인한 위험도에 대해 국가 수준 '높음', 아프리카 지역 수준 '보통', 전 세계적 수준 '낮음'으로 평가함.
- 국내에서는 에볼라바이러스병 발생 및 해외유입 사례 보고 없음. 질병관리청은 DR콩고를 포함한 아프리카 7개국을 에볼라바이러스병 검역관리지역으로 지정하여 입국자 검역을 강화하고 있음. 해당 국가 방문 시 과일박쥐, 영장류, 야생동물과 접촉을 삼가하고, 현지 장례식장 방문을 자제 하도록 함. 의료기관 방문 시에는 마스크 등 개인보호구를 착용하고 예방수칙을 철저히 준수할 것을 권고함
 - 귀국 후 잠복기(21일) 이내 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등의 의심 증상이 있을 경우 질병관리청 콜센터(1339) 또는 보건소로 문의할 것을 당부함.

국내·외 감염병 발생동향

국외 페스트

- (몽골) 몽골에서 25년 첫 림프절 페스트 환자 3명 발생 보고, 1명 사망

- 골 북부 흠스골(Khovsgol) 주에서 '25년 첫 림프절(bubonic) 페스트 환자 3명 발생(1명 사망) 보고됨 (9.8.). 사망 환자는 24세 남성 유목민으로 치료 중 사망했고, 거주 지역에서 포획하여 섭취한 마멋(marmot) 고기가 감염원으로 추정됨. 나머지 2명은 각각 경증과 중증 상태로 치료 중임.
- 보건당국은 밀접접촉자 96명(의료진 41명, 환자의 가족이나 지인 55명)을 격리 조치하였으며, PCR 검사 결과 22명이 페스트 양성으로 확인됨.
- 몽골의 총 21개 주 중 17개 주 및 137개 сом(몽골의 시군구 단위)을 페스트 위험지역으로 관리 중이며, 환자가 발생한 흠스골 주 츄가안울 지역 일대는 페스트 풍토지역(설치류-벼룩 매개)으로 분류됨.
- '14~'24년 몽골에서 페스트 인체감염 사례가 20명('20년 6명으로 최다) 발생했고 이 중 9명이 사망해 치명률은 약 45%로 나타남. 연평균 1~2명 발생 수준임.
- 몽골 보건당국은 현재 발생한 페스트 감염사례는 설치류·벼룩 노출에 의한 인체감염 사례로 파악하며, 사람 간 비말전파 위험이 큰 폐렴형 페스트는 아닌 것으로 판단함.
- 몽골 북부의 페스트 위험지역에서 보고된 사례이나 사망자가 발생했고 밀접접촉자의 규모(96명)가 크기 때문에 강력한 통제조치가 추진되어 발생지역 주민의 7일간 외부 이동 금지, 학교수업 및 집합 행사를 비대면으로 전환, 24시간 검문 강화 등을 실시 중.
- 또한 가을철 수렵 등 야외활동이 증가하는 시기인 점을 고려하여 야생동물의 사냥·섭취·접촉을 금하고 개인위생 수칙을 강화할 것을 권고함.
- 국내에서는 현재까지 페스트 환자 발생 없음. 미국 등 페스트 유행지역 여행자는 감염 예방을 위해 야생동물(쥐, 마멋, 산토끼) 접촉 및 섭취 금지, 페스트 의심증상(발열, 기침, 가래, 구토 등)이 있는 사람과 접촉 금지, 청결한 거주 환경 유지(벼룩 주의)할 것을 당부함. 또한, 여행 후 잠복기(1~7일) 동안 자신의 건강상태를 관찰하고 발열 등 의심 증상이 있을 경우 1339(질병관리청 콜센터) 또는 관할 보건소로 연락할 것을 권고함.



에볼라바이러스병 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

Protect yourself from Ebola, and make sure to follow these essential steps!

에볼라바이러스병 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to an Ebola-affected area?

- ✔ **에볼라바이러스에 감염된 동물 또는 사람의 혈액, 체액 등과의 직접 접촉을 통해 감염되는 급성 발열성·출혈성 질환**
 Ebola spreads through direct contact with the blood, body fluids, or tissues of infected animals or people.
- ✔ **초기에는 발열, 식욕부진, 무력감, 발진 등 증상이 나타나고, 이후 구토, 설사, 복통 등 위장관 증상 및 원인불명 출혈 등을 호소**
 Early signs include fever, loss of appetite, fatigue, and rash, followed by vomiting, diarrhea, abdominal pain, and unexplained bleeding.
- ✔ **국내 상용화된 백신과 치료제가 없으므로, 예방이 가장 중요!**
 There is no available vaccine or treatment in the country, so prevention is crucial!

에볼라바이러스병 이렇게 예방하세요! ✔

How to protect yourself from Ebola!



야생동물 직접 접촉 및 섭취 금지
(과일박쥐 및 생 과일박쥐류 등)
Avoid direct contact with and consumption of wild animals
(including fruit bats and raw fruit bat products)



의료기관 방문 및 장례식 참석 자제, 참석 필요 시 개인보호구 착용
(특히 에볼라바이러스병 의심 사망자 및 의심자 접촉 금지)
Limit visits to medical facilities and funerals. If you must attend, wear protective gear.
(Avoid contact with anyone suspected of having Ebola or who has died from it.)



아픈 사람과 접촉 삼가하기
 Avoid close contact with sick individuals.




비누로 30초 이상 손씻기
 Wash your hands with soap for at least 30 seconds.



오염된 손으로 얼굴 만지지 않기
 Avoid touching your face with unwashed hands.

※ 여행 후 자신의 건강상태 21일간 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우 **1339 콜센터**로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 21 days after travel. If you show any symptoms, call **1339** for advice.





페스트 예방, 이것만은 꼭 지켜주세요!

Protect yourself from Plague, and make sure to follow these essential steps!

페스트 유행지역을 여행 중이신가요?

Traveling to a plague-affected area?

- ✔ **페스트 균에 감염된 벼룩 또는 쥐, 산토끼 등의 야생동물에 물리거나 접촉하여 감염**
 The plague is transmitted through bites from fleas that have bitten infected rodents or wild animals like rats and rabbits, or through direct contact with these animals.
- ✔ **통증이 있는 림프절 부종, 고열, 권태감, 두통, 근육통, 오심, 구토 등**
 Symptoms include swollen, painful lymph nodes, high fever, fatigue, headache, muscle pain, nausea, and vomiting.
- ✔ **페스트 발생지역 여행 후, 잠복기(1~7일) 동안 자신의 건강상태 확인 필요**
 After traveling to a plague-affected area, monitor your health during the incubation period (1-7 days).

페스트, 이렇게 예방하세요! ✔

How to protect yourself from the plague!



**야생동물(쥐, 마멋, 산토끼)
접촉 및 날것 섭취 금지**

**Avoid contact with wild animals (rats, marmots, rabbits)
and do not eat them raw.**



**청결한 거주 환경 유지
(벼룩주의)**

**Keep your living environment clean.
(Beware of fleas.)**



**페스트 의심증상 있는
사람과의 접촉 삼가 (발열, 기침, 가래, 구토 등)**

**Avoid contact with people
showing symptoms of the plague
(fever, cough, sputum, vomiting)**



**비누로 30초 이상 손씻기 등
개인위생 수칙 준수**

**Follow personal hygiene rules
including washing hands for at least 30 seconds.**

※ 여행 후 자신의 건강상태 7일간 동안 관찰, 감염병 의심증상 있을 경우  콜센터로 전화하여 상담

※ Monitor your health for 7 days after travel. If you show any symptoms, call  for advice.

ICDC Weekly

인천광역시 감염병 주간소식지

